

6-12 pcs.—Bleu, 1/4 pc., axillaires; très rude, hérissée.—Graines.—
Terrains cultivés.—Sarcler, biner.

Grémil des champs, Corn Cromwell.—*Lithospermum arvense*, L., Europe.—1 an, 6-12 pcs.—Blanchâtre, 1/8 pc., axillaires.—Graines, dans le grain.—Champs de grain.—Semer graine propre, labourer chaumes tôt.

Barnadette; Blue Bur.—*Echinospermum Lappula*, Lehm., Europe.—1 an et ann. d'hiver, 1 pied.—Bleu, 1/8 pc., axillaires; grappes feuillées.—Graines, portées par animaux.—Champs de grain, bords des chemins; laine.—Jachérer, biner.

Langue-de-chien; Burs.—*Cynoglossum officinale*, L., Europe.—Vivace, 1-2 pds.—Violet rougeâtre, 1/4 pc., grappes.—Graines, portées par animaux.—Champs de grain, bords des chemins; laine.—Ciseau à long manche, faucher.

CONVOLVULACÉES

Veron des champs; Bindweed.—*Convolvulus arvensis*, L., Europe.—Vivace, grimpant.—Rose, 1 pc., solitaires; très peu de fleurs.—Graines, dans le grain, longues tiges souterraines.—Champs, toutes les cultures.—Labourer, biner fréquemment.

Veron des haies; Morning-glory.—*Convolvulus sepium*, R. Br., indigène.—Vivace, grimpant.—Rose, 1 pc., solitaires; très peu de fleurs.—Vivace, grimpant.—Rose ou blanc, 2 pcs, solitaires.—Graines, tiges souterraines.—Champs.—Biner fréquemment.

Escute du thym, Clover Dodder.—*Cuscuta epithymum*, Murr., Europe.—1 an, grimpante.—Blanchâtre, 1/8 pc.; grappes le long des tiges orange.—Graines, dans graines de trèfle et de luzerne.—Champs de trèfle et de luzerne.—Semer graine propre, faucher avant maturité des graines.

SOLANÉES

Morelle noire, Tue-chien; Common Nightshade.—*Solanum nigrum*, L., Europe.—1 an, 6 pcs.—Blanc ou lilas, 1/4 pc.; grappes ombelliformes.—Graines.—Champs, jardins, toutes les cultures.—Biner, sarcler.

Morelle épineuse; Thorn-apple.—*Datura Stramonium*, L., Asie.—1 an, 2-4 pds.—Blanche, 2 pcs, solitaires; plante verte.—Graines.—Lieux incultes: vénéneuse.—Faucher, sarcler.