Saskatchewan Government

Sundhetsstyrelse

BUREAU OF HEALTH

FÖRESKRIFTER

2dra DEL.

Smittosamma sjukdomar i hotell logi- och boardinghus.

Sjukdomsfall i hotell—

7. Vid sjukdomsfalls inträffande i hotell eller liknande allmänt ställe, måste den angripne antingen förflyttas till hospital eller avskiljas till särskild del av bygnaden så att samband med gästrum, klosett, etc. fullständigt avskäres. Rummet måste bära vederbörliga plakat. Ägare eller innehavare av dylika ställen äro ålagda vid ansvar att rapportera alla utbrott av sjukdom inom tolv timmar efter upptäckt därav.

Sjukdomsfall i skola.

8. Många sjukdomsfall upptäckas i skolor, och lärarne äunna därför ej vara nog vaksamma i observerandet av tidiga symptomer av sådana allmänt förekommande barnsjukdomar, såsom skarlakansfeber, difteri, mässling, kikhosta och påssjuka.

Symptomerna äro: Förkylning i huvudet, ont i halsen och ögonen, huvudvärk, rastlöshet etc.

Skola behöver nödvändigtvis icke stängas, därför att en del sjukdomsfall upptäckts, men största försiktighet måste iakttagas vid examinering av barnen under de tidiga sjukdomssymptomerna. Hälsovårdsmannen, eller the Commissioner, må avgöra om stängning av skolan är av nöden.

I vissa fall vid utbrott av epidemi, må hälsovårdsmännen bestämma, att i stället för skolans stängning, barnen underkastas daglig axeminering av läkare eller kvalificerad sjuksköterska. Periodisk rengöring av skola skall alltid äga rum.

Ventilering av skolrum skall noga ombesörjas av läraren, enär instängd och förskämd luft är en verksam smitto-befordrare. Under rasterna skola rummen ordentligt vädras.

De bästa desinfectionsmedlen äro öppna fönster och solljus samt såpa och vatten för pulpeter och golv.

Förbjuden skolgång.

9. Barn eller annan person som angripits av eller tillfrisknar efter smittosam sjukdom få ej besöka privat, publik, kyrko-, söndags- eller annan skola, utan skriftligt tillstånd, (intygande att barnet eller personen ej längre utgör en smittofara för allmänheten) utfärdat av hälsovårdsmannen eller inkallad läkare. Lärare må utesluta från skolan den, som ej innehar dylikt certifikat; icke heller får barn eller annan person boende på ställe, där smittosamt sjukdomsfall vårdas eller bott därstädes intill en vecka före sjukdomens upptäckt, tillåtas besöka skola utan sådant skriftligt tillstånd. I städer skola dessa certifikat utfärdas endast av medicinsk hälsovårdsman.

Vaccinering i skolorna.

10. Skolstyrelsen och övriga myndigheter i undervisningsväsendet må när som helst påbjuda att barn, bevistande skolor under deras kontroll, förbjudas tillträde, om de ej kunna till läraren överlämna intyg om ordentligt undergången vaccinering.

Pediculosis.

(Löss i huvudet).

11. Löss i huvudet, utom att vara ett bevis på slarv med kroppens renlighet, står i mera samband med allmän hälsa än man föreställer sig, sedan man nu uppdagat den roll, som insekter spela i kringförande av smitta.

Lärare måste noga hålla efter barnen i fråga om renlighet, att de ej bliva en källa till smittofara för sina kamrater, och må utesluta från skolan barn, som äro behäftade med löss, skabb eller ringorm.

Smittosam sjukdom på farm eller mejeri, där mejeriprodukter tillverkas.

12. Vid fall av difteri, amoebic eller bacillary dysentry, epidemisk cerebro spinal meningitis, barnförlamning, epidemisk eller septic halssjuka, skarlakansfeber, smittkoppor, nervfeber, på farm eller mejeri, där smör, ost, mjölk, grädde eller andra mejeriprodukter produceras för avyttring, är tillkallad läkare skyldig att omedelbart inrapportera saken till den lokala hälsovårdsmannen.

Omedelbart rapport:—I den händelse läkare ej kan tillkallas, är det ägarens eller föreståndarens av sådan farm eller mejeri skyldighet att omedelbart inrapportera saken till den lokala hälsovårdsmannen. Det är den lokala hälsovårdsmannens skyldighet att omedelbart rapportera till "the Commissioner of Public Health" per telegraf eller telefon att sjukdomsfall inträffat på så och sådan farm eller mejeri, jämte övriga dithörande omständigheter, samt även bifoga namnen på de platser, dit nämnda mejeriprodukter sändas för avyttring.

Minimalperiod för isolering och karantän.

13. I denna förordning skall minimalperioden för isolering och karantän vara som följer:

För patienter:

Smittkoppor:—Karantän för två veckor efter det sjukdomen utvecklat sig, och därefter tills kopporna fallit av och såren läkts upp fullständigt.

Skarlakansfeber: — Karantän för fem veckor och längre till hudens avfjällning fullständigt försiggått och avsöndringar från näsa, öron och hals upphört.

Difteri: — Karantän för två veckor efter sjukdomens utveckling och längre tills negativt prov från näsan och halsen gjorts av den provinsiella bakteriologen.

Mässling:—Isolering för en vecka efter upptäckten av utslag och längre tills alla avsöndringar från näsa, öron och hals upphört och hostan avstannat.

German Measles: — Isolering för tio dagar.

Vattenkoppor:— Isolering för tolv dagar sedan säker diagnosis gjorts och längre tills skorporna helats upp fullständigt.

Påssjuka: — Isolering för tre veckor sedan sjukdomen försvunnit eller tills den tillkallade läkaren eller medicinska hälsovårdsmannen anser, att patienten ej längre är en fara för hälsan.

Kikhosta: — Isolering upptill åtta veckor efter sjukdomens utbrott och en vecka efter det sista för sjukdomen kännetecknande hostanfallet.

Epidemic Cereber Spinal Meningitis: — Isolering för minst två veckor och längre tills avsöndringar från mun, näsa, ögon och öron upphört.

Barnförlamning: — Isolering för sex veckor efter sjukdomens utbrott.

Nervfeber och paratyphoid:—Isolering och fullständigt tillfrisknande enligt läkarens utlåtande.

Nervfeberbärare skola icke isoleras på obestämd tid utan avhållas från sysselsättningar, som bringa dem i beröring med födoämnen eller nära umgänge med andra personer. Medicinsk hälsovårdsman eller the Commissioner äger rätt underkasta personer, som äro eller misstänkas vara bärare av typhoidbaciller, att undergå behandling för att utröna närvaron eller frånvaron av baciller i systemet.

Om sådan person vägrar att undergå dylik behandling äger the Commissioner rätt att sätta honom under karantän tills bifall gives.

För personer i beröring med sjuka.

Smittkoppor:—Karantän tills vaccination utförts eller läkare intygat att personen i fråga undergått ordentlig vaccination inom de sista två åren.

Skarlakansfeber: — Vuxna personer, som förut genomgått sjukdomen, lösgivas efter disinfektionsbad och ombyte av rena kläder. Barn hållas i karantän under en vecka och lösgivas efter disinfektionsbad och ombyte av rena kläder.

Difteri:—Med avseende på person i de fall, där inga klinikala symptomer förefinnas eller genom insprutning av antitoxin gjorts oemottaglig för smitta eller efter undergånget prov elter "Schicks" metod befunnits vara oemottaglig för smitta, må sådan under observation varande person lösgivas. Om, emellertid, läkare, hälsovårdsman eller the Commissioner anser, att förnyad injektion av antitoxin är nödvändig, skall denna behandling företagas ofördröjligen. Kostnaden för antitoxin skall bäras av personen i fråga eller av hans eller hennes fader eller annan målsman. Skulle den behandlade vara medellös, skall behandlingen bekostas av den municipalitet personen ifråga befinner sig i.

Mässling: — Lösgives efter disinfektionsbad och ombyte av rena kläder om "immune" efter föregående attack. De, som ej äro "immuna" isoleras för tio dagar.

German Measles: — Isolering för två veckor.

Vattenkoppor:—Lösgivas, om "immuna" genom föregående attack, i annat fall isolering för tolv dagar.

Kikhosta: — Isolering ej nödvändig om man ej varit i beröring med den sjuka.

Epidemisk Cereber Spinal Meningitis: — Lösgivas efter disinfektionsbad, följd av grundlig tvättning med tvål och vatten och grundlig sköljning av mun och näsa med något disinfektionsmedel.

Barnförlamning: — Isolering för fjorton dagar, räknat från sista beröringen med den sjuka, för barn under sexton år. Vuxna personer må fortsätta med sitt arbete om detta ej bringar dem i beröring med barn.

Tyfusfeber och Paratyphoid: — Behöva ej isoleras.

Allmänna förhållningsregler.

Förebyggande:—Fönster och dörrar till rum där sjuka vårdas skola vara så utrustade, att flugor, moskiter etc., utestängas, och husdjur av något slag få på inga villkor ha tillträde till sjukrummet.

Rum, som avsatts för sjuklings behov, skall, om möjligt, förläggas i en enskild byggnad, flygel eller övervåning och, om möjligt, så att det kan avstängas från familjens övriga boningsrum.

Alla överflödiga möbler, mattor, gardiner, böcker och tavlor skola flyttas ur rummet innan patienten införes.

Intet hantvärk, såsom skrädderi, sömnad, tvättning, fabrikation av cigarrer eller andra varor får pågå i hus där sjuk finnes, och icke häller får ett sjukrum stå i direkt förbindelse med mejeri, handelsbutik, postkontor, bageri, restaurang eller andra platser där matvaror, frukt och konfekt tillverkas eller saluhållas.

Tvättinrättningsutkörare äro förbjudna att besöka hus, som hyser patient i smittoförande sjukdom, samt mottaga eller avlämna klädespärsedlar, och icke häller få klädespärsedlar av något slag skickas till tvättinrättning för rengöring utan att de först desinficerats eller steriliserats enligt föreskrift av hälsovårdsmannen eller the Commissioner.

Mjölk får endast avlämnas i flaskor under förseglat omslag, och flaskor få ej återlämnas eller utbytas utan att först hava grundligt disinficerats eller steriliserats på anvisning av läkaren. Om kärl ställas utom huset för att mottaga mjölken, må mjölkavlämnaren hälla mjölken däri, men avlämnaren såväl som innehavaren äro ansvariga att reglerna ej överträdas.

Personer, som avlämna födoämnen och andra varor, från kryddbod, kötthandel, bageri eller annan affär, äro förbjudna tillträde eller att medtaga paket därifrån.

Mottagning av pänningar eller mjölk och brödpoletter får icke äga rum på plats förklarad i karantän.

Alla rum, som använts av person angripen av smittoförande sjukdom, anses besmittade, och när de blivit utrymda genom dödsfall, förflyttning eller tillfrisknande av patienten, skola med sitt innehåll grundligt desinficeras enligt föreskrift i dessa regler. Alla personer, som vistats i rummen medan karantänen eller isoleringen, måste desinficera sina kläder innan de frigivas.

Person, angripen av smittkoppor, skarlakansfeber, mässling, difteri, kikhosta eller vattenkoppor, är förbjuden att resa i banvagn, spårvagn, ångbåt eller annat offentligt transportmedel. Patienter, som så resa, eller föräldrar och målsmän, som det medgiva, göra sig skyldiga till överträdelse och straffas med böter på högst femtio dollars.

Medicinsk hälsovårdsman, eller sanitetsinspektör äger myndighet att på dylikt offentligt transportmedel anhålla person eller personer och avföra dem därifrån, samt kvarhålla transportmedlet tills det blivit desinficerat; han må likaledes tillkalla den hjälp han behöver för genomdrivandet av de åtgärder han vidtagit.

Alla rum måste hava ordentlig ventilation medelst fönster och så mycket solljus som möjligt.

Läkare och sjuksköterska skola under vistelse i sjukrummet hava över sig en klädnad, så att de ej må bära omkring smittofrön på sina gångkläder.

Patienter och sköterska och andra personer, som stått i beröring med den sjuka, måste, innan de upptaga umgänget bland friska eller publiken, taga ett bad med kvicksilverkloridlösning, styrka: 1 drachm till en gallon vatten, åtföljd av bad med tvål samt ombyte av rena kläder.

Särskilda förhållningsregler för sköterskor och patienter vid de mera vanligt förekommande smittoförande sjukdomarne.

Smittkoppor:—Denna sjukdom smittar genom direkt beröring eller utdunstning från den sjuke eller genom saker, som använts av den sjuke. Sträng karantän måste därför genomföras.

Vaccination och revaccination är det enda säkra skyddsmedlet i denna sjukdom. Grundlig desinficering och oskadliggörande av alla uttömningar måste noga efterses. Tyg, vadd och andra omslag som förorenats av avsöndringen måste uppbrännas.

Skarlakansfeber: — Denna sjukdom förekommer allmännast i barndomen, men fastän den är mycket smittosam, är det möjligt att begränsa dess spridning genom sträng karantän så fort sjukdomen upptäckts, samt användning av proper sjukrumsmetod. Lindriga fall behöva lika noggrann eftersyn som de allvarliga, enär sjukdomsfröet är mycket farligt under alla omständigheter.

Personer, som varit nära den sjuka, eller saker, som varit i beröring eller förorenats av den sjuka, kunna sprida sjukdomen till andra.

Avsöndringen från näsa, öron och mun skola upptagas med tyglappar eller vadd och brännas. Avföring och urin måste desinficeras innan det utslås.

Födoämnen, isynnerhet mjölk, bör icke få stå kvar i sjukrummet.

Om möjligt skall endast en person ha hand om vården av den sjuka.

Fönster, dörrar och alla övriga öppningar skola vara så utrustade att flugor, moskiter och andra insekter utestängas.

Rummen skola ordentligt ventileras.

Difteri:—Denna sjukdom är mycket smittosam och är huvudsakligen en halssjukdom, förorsakad genom difteribacillens tillväxt.

Sjukdomen sprides vanligen genom direkt beröring, därför är fullständig karantän nödvändig. Alla personer, som varit utsatta för smitta, kunna skyddas genom behandling av antitoxin, insprutning av dos på 1 till 2,000 units. Skyndsam användning av antitoxin för den angripne uppmanas.

Saker, som förorenats genom avsöndringar från mun, näsa, öron och ögon, måste uppbrännas och exkrementer desinficeras innan de uttömmas. Sköljningar från näsa och hals måste skickas till provinsens bakteriolog för undersökning, sedan de klinikala symptomerna försvunnit, för att utröna huruvida baciller förefinnas eller ej.

Nervfeber: — Denna sjukdom har sitt säte i tarmkanalen och är av allvarlig beskaffenhet på grund av de många olika sätt smittofröet intränger i kroppen genom vatten och mjölk, föda, fingrar och flugor.

Smittan införes i kroppen endast genom munnen, det är, att mat och dryck, som förtäres, blivit bemängda med baciller från en nervfeberpatients uttömningar.

Noggrann isolering av den sjuka under hela perioden av sjukdomens förlopp är av nöden.

Sköterskor kunna icke vara nog omsorgsfulla i oskadliggörandet av den sjukas uttömningar, alldenstund tarmarnes och njurarnes uttömningar äro de huvudsakliga medel, varigenom smittoämnet sprides.

Anti-typhoid vaccin är ett skyddsmedel för friska.

Provinsens bakteriolog assisterar vid tagandet av diagnosis genom examinering av blodklottar.

Mässling: — Denna sjukdom är den mest smittosamma av utslagssjukdomar bland barn, ehuru nästan alla personer synes vara mottagliga. Det är en allvarsam sjukdom på grund av de sviter, som oftast medfölja.

Isolering, som vanligtvis försummas, är det bästa medel, varmed spridning av smittan kan förhindras, och familjer, som hemsökas, kunna icke vara nog skrupulösa i detta avseende.

Smittoämnet förekommer i näsans och halsens avsöndringar, och dessa skola upptagas på tyg- eller pappersbitar och uppbrännas.

När huden fjällar av sig, bör kroppen tvättas i varmt tvålvatten och ingnidas med olja eller vaselin.

Kikhosta:—Denna är en akut sjukdom, som vanligtvis utbryter epidemiskt. Endast genom att iakttaga noggrann isolering av de angripna kan spridning hämmas.

De sjuka barnen skola avskiljas från de friska, vilket är den bästa skyddsåtgärden. Sviter vilja ofta inställa sig och största försiktighet måste iakttagas att oskadliggöra alla upphostningar och uppkräkningar.

Lungsot: — Denna sjukdom förorsakas genom inandning eller sväljning av en bacill, som benämnes tuberkelbacillen, vilken förekommer i upphostningarne av den angripne. Patienter, som hosta och nysa, giva ifrån sig rikligt med smittoämne, och därsom baciller föras under ett host- eller nysanfall flera fot i luften. Om upphostningarna vårdslöst utspottas på golv, trottoarer och allmänna platser, torkas de in med dammet och på så sätt blandas bacillerna med luften, kringföras av vinden och inandas och så frön till nya sjukdomsfall.

Härav framgår tydligen att lungsoten är en sjukdom, som till stor del kan hållas under kontroll samt att förmågan att utrota sjukdomen förnämligast vilar hos den person, som är angripen därav. Därför är det högst väsentligt att patienten undervisas i hygieniska metoder att taga vara på sig själv och visa försiktighet med spottning, hostning etc.

Upphostningar skola upptagas i tyg- eller papperslappar och noga uppbrännas. Vid nysning eller hostning bör patienten hålla en tygbit för ansiktet att förhindra bacillernas utspridning i luften.

Porslin och andra saker, som användas vid måltidernas intagande skola hållas avskiljda och ofta diskas i kokande vatten.

Sjuksköterskan skall undvika att hantera spottkoppar; tygtrasor böra användas för upphostningar om möjligt. Patienten kan vanligtvis lägga dem i en papperspåse eller tidningspapper och alltsammans kan sedan uppbrännas.

Alla fall skola rapporteras till hälsovårdsmannen, som måste vidtaga mått och steg att förhindra smitta.

Barn, som är angripet, får icke bevista skolan förrän det medför intyg på, att det ej är farligt för kamraternas hälsa.

När en person, som lider av lungsot, avflyttar till annan plats, måste fader, målsman eller läkare därom underrätta den medicinske hälsovårdsmannen i det distrikt, där sådan person ämnar bosätta sig.

Hus, som blivit utrymt genom dödsfall eller utflyttning av person, som lider av lungsot, måste desinficeras enligt föreskrifter angivna i dessa regler.

Alla gångkläder, sängkläder och övriga pärsedlar, som brukats av den sjuka eller varit utsatt för smittofara, måste desinficeras enligt föreskrifter angivna i dessa regler.

Personer, vars saliva befunnits innehålla tuberkelbaciller skola därom upplysas, så att de förstå, att de på detta stadium äro en smittofara. De, som visa sig likgiltiga i att vidtaga de nödiga försiktighetsmåtten, må, på order av the Commissioner, isoleras eller sättas i karantän.

Regelbundna desinficeringar av de rum, som användas av patienten är av nöden för att beskydda sjuksköterskorna från smitta eller återfall bland patienterna.

Barnförlamning. — Denna sjukdom förorsakas genom en ofantligt liten organism, som överföres från en person till annan och som utvecklar sig i näsans och munnens slemhinnor. Förlamning i en kroppsdel inträder vanligtvis, därav sjukdomens namn.

Sjukdomen uppträder vanligtvis under den varmare årstiden och angriper isynnerhet välfödda och hälsosamma barn i åldern mellan ett och tre år, men personer i alla åldrar äro ingalunda fritagna.

Avsöndringar från näsan och spott äro smittoförande och damm, flugor och djur anses tjäna som smittospridare. En person kan, utan att angripas av sjukdomen, bära smittofröet på sig och och sprida det till andra. En sådan individ kallas "carrier".

De första tecknen äro trötthet, ryckningar och ibland styvhet i halsen och ryggens muskler åtföljd av förlamning i någon form, såsom tillbakaböjning av huvudet eller försvagning av någon lem. Kräkning är en ofta förekommande tidig symptom.

De skyddsåtgärder utom isolering, som föreskrivas, äro: Nät över dörrar och fönster för att utestänga flugor och insekter; utestängning av alla husdjur; desinficering av alla saker, tagna från rummet; alla artiklar, som kunna kokas, böra kokas; avsöndringar från mun och näsa desinficeras och förstöras.

Magens uttömningar måste desinficeras innan de slås ut i vattenklosett eller grävas ned i jorden.

Sköljning av mun och näsa med en utspädd lösning av peroxide of hydrogen eller Dobell's lösning förordas.

Epidemisk Cerebro Spinal Meningitis: — Smittoämnet i denna sjukdom förekommer i näsans och munnens avsöndringar, och dessa avsöndringar måste därför desinfekteras. Gurgling av halsen och sköljning av näsan tillrådas dem, som varit utsatta för smitta.

Den tillkallade läkaren skall giva föreskrifter rörande spottning, nysning och hostning. Näsdukar och matkärl skola grundligt desinficeras och iakttagande av den största renlighet i fråga om tändernas, munnens, näsans och halsens vård måste förehållas de personer, som vårda den sjuke.

Phophylactic agenter.

Vaccinens verksamhet sera och vira har blivit noga prövad, så att ingen kan finna någon ursäkt för att ej använda det.

För pephylaxix och behandling av tuberkulos, tatanus, rabies och cebro spinal meningitis kan vaccin och serum erhållas från Bureau of Public Health. Läkare och hälsovårdsmän uppmanas att skaffa direkt från Department of Hygiene, Toronto University, de vanligen använda vaccinerna och sera såsom för smittkoppor, tyfus och difteri.

Man bör noga se till att de förvaras på kalla och torra platser och att inget serum användes efter det datum, det är aktivt.

Tyfusvaccin furneras till alla, som kunna använda det, där man fruktar att sjukdomen skall utbryta, såsom timmerläger, gruvläger, tröskarlag etc.

Desinfektion.

Rum: — Efter död, förflyttning eller tillfrisknande av en patient från smittkoppor, skarlakansfeber eller pumonary tuberkulos, måste det rum, i vilket patienten vårdats, desinficeras på följande sätt:

Rummet bör beredas genom att ha alla öppningar, dörrar och andra hål förseglade. Temperaturen bör ej vara under 60 grader Fahr. och atmosfären fuktig.

1. Rökning med formalin (40 proc. starkt) på ett lakan, som blivit indränkt och upphängt på ett rep tvärs över rummet; lösningen skall vara 10 ozs formalin till 1 ozs vatten på varje 1,000 kubik fot.

2. Eller genom att stänka väggar, golv och sängar och möbler med en formalinlösning — 10 ozs formalon till 10 ozs vatten.

3. Eller genom att hälla 10 ozs av formalin över 4 ozs permanganate of pottassium i en stor metallhink; formalinen hälles över kristall, icke på annat vis.

Rummen böra hållas stängda för minst åtta timmar. Sedan man ventilerat genom att öppna fönstren bör allt träarbete, möbler och fönster noga tvättas med såpa och vatten eller sådan anticeptisk lösning som karbol, izal och lysol.

Ventilation, d. v. s. frisk luft och solsken med såpa och vatten är det viktigaste och mset verksamma desinfektionsmedlet och deras bruk kan icke nog predikas.

I fall av andra sjukdomar göras rummen rena med såpa och vatten och soda, varefter luft och sol få fritt tillträde.

Följande försiktighetsmått måste iakttagas i varje fall av sjukdom:

Särskild porslin hålles för patienten och bör tvättas med kokande vatten efter användningen.

Alla föremål, som komma i kontakt med patienten böra desinfekteras.

Alla kläder och sängkläder böra behandlas på följande sätt:

Bomull och linnekläder: fuktig värme, ånga och kokning.

Sängkläder och linne böra dränkas i en lösning av 10 proc. formalin.

Yllekläder: Ånga användes, om sådan finnes, annars böra de utsättas för ångorna från formalinlösning (10 proc. styrka) under åtta timmar, antingen i ett tätt slutet rum eller i en lufttät låda eller säck.

Filtar etc.: Desinficiera med ånga, om möjligt, eller i lufttäta lådor och bestänk med 10 proc. lösning av formalin och utställ det under åtta timmar.

Madrasser: Om smutsiga, brännas de. Annars bestänkas de med 10 proc. lösning av formalin och utställas under åtta timmar.

Patientens avsöndringar: Från mun, näsa och ögon mottas i mjukt kläde och absorberande bomull, som brännes.

Exkrementen mottas i vanliga sjukdomsapparater i vilka finnas en lösning på 10 proc. formalin, karbol, izal eller lysol och kastas i kloakledningen.

Andra desinficieringsmetoder kunna användas på hälsovårdsmans rekommendation.

Straff.

Alla som försumma eller vägra att följa dessa regler, skola förklaras skyldiga och skola straffas med böter icke understigande två dollars och omkostnader och ej mer än $50 och omkostnader.

Då det är nödvändigt att döma en person, och fredsdomaren eller polisdomaren finner, att brottet bevisats, skall förutom böter döma att hälsovårdsmyndigheternas order utföras på den felandes bekostnad.

J. M. McLeod,
Clerk Executive Council.

JOHNSON
BAGGAGE TRANSFER
FLYTTNING UTFÖRES.
Phone Garry 244.
294 Park Street.
WINNIPEG, MAN.

LÄKARE.

415—417 Pritchard Ave., Winnipeg.
Tel. St. John 474.
DR. B. GERZABEK
LÄKARE
som erhållit diplom i Österrike-Ungern, Tyskland, London, England, Canada etc. F. d. assisterande läkare vid de kungliga och kejserliga klinikerna i Wien, Krakau, Prag, Berlin, Paris och London, England.
SPECIALIST
för mag- och lunglidande, sjukdom i inälfvorna, könsorgan och fruntimmerssjukdomar, sår, förlossningar och operationer. Behandling i och utom hemmet, skräl som i mitt privatsjukhus. Besökande läkare å St. Boniface och General hospital.
Mottagningstid: 8—12 f.m., 2—6 e.m. 7—10 på kvällen.

Dr. R. L. HURST
Medlem af Royal College of Surgeons, England. Licentiat af Royal College of Phisicians, London. Specialist: Bröst-, näre- och kvinnosjukdomar.
Kontor: 305 Kennedy Bldg. Portage Ave., midt emot Eatons. Telefon Main 814.
Kontorstid: 3—5 och 7—9.
Bostadstelefon Garry 1175.

Björnson & Brandson
LÄKARE.
Cor. William and Sherbrooke.
Mottagningstid: 2—5, 7—8 e.m.
Bostadstelefoner: Garry 321 — Garry 769

DR. J. STEFANSSON
Isländsk specialist på ögats, öratats, näsans och strupens sjukdomar.
401 BOYD BUILDING,
Hörnet af Portage ave. och Edmonton.
Tel. M. 3088 eller Garry 2315.

SKANDINAVISK ADVOKAT.
Tel.: Kontor, Main 6131 och 6132
Residens, Sher. 4440.
A. M. DOYLE, L.L.B.
Advokat, juridiskt ombud, notarie, etc.
514 Sterling Bank Bldg., Winnipeg.

SKANDINAVISKA ADVOKATER
811 MacArthur Bldg.
Telefoner: Main 4503 och 4504.
ROTHWELL, JOHNSON & BERGMAN
P. O. Box 1656.
WINNIPEG, MANITOBA

PERCHERON BELGIAN & HACKNEY HINGSTAR
till salu på liberala villkor och garanti.
Breeders Lien notes lämpliga för kollektering af hingstbetjäning 50 cents per hundra.
Hingstbok med plats för 100 entrees, 25 cents.
J. H. GRAHAM
Barn: Ave. E., 21st st.
Saskatoon, Sask.

EDMONTON ALTA.
DR. J. BOULANGER
Post Graduate från Paris och London sjukhus. F. d. Kirurg Misericordia Maternity, Montreal
Genito-Urinary Diseases Laboratorium
Kontor och bostad:
10011 Jasper Ave., Edmonton, Alta.
Nästa dörr till Yale Hotel
Telefon 1032.

JACKSON BROS.
Juvelerar- och guldsmedsaffär.
9962 Jasper Ave., East.
Speciellt uppmärksammas postorders.
Ur- och juvelreparationer.
Telefon 1747, Edmonton, Alta.

North Star Drilling Co.
Canadensiska agenter
GUS PEECH FOUNDRY CO.
Monitor Drills och Angers
Hörnet Broadway och Armour St.,
REGINA, SASK.

FREDA SIMONSON
Concert Pianist
and
Teacher of Pianoforter
Late pupil of Milan Sokoloff.
Studio, Suite 32, Machray Apts.

Flere stenografer och bokhållare önskas
Det är betydlig brist på kompetent kontorsfolk i Winnipeg på grund af att så många kontorsmän tagit värfning.
THE SUCCESS BUSINESS COLLEGE
Graduenter äga företräde. SUCCESS är det största — starkaste — mest pålitliga. Det tränar flera studenter än alla konkurrenter tillsammans —har tio afdelningsskolor — enrollerar mer än 5,000 studenter om året. Har artiga, kompetenta, skickliga lärare. Enrollera när som helst. Efterskrif upplysningar.
THE SUCCESS BUSINESS COLLEGE, LTD.
COR. PORTAGE & EDMONTON,
WINNIPEG, MAN.

J. E. Stendahl
328 LOGAN AVENUE
Dam- och Herrskrädderiaffär.
Lager af tyger i modärna färger.
Pressning och Cleaning utföres prompt och billigt. Gör ett besök. Belåtenhet garanteras.