

PEDIATRIE

Traitement de la syphilis des nouveaux-nés, dans le *Scalpel*, 10 août 1902.

I. Syphilis héréditaire congénitale :

1. Entourer l'enfant de soins dès sa naissance ; éviter les refroidissements.
2. Avant chaque tétée, dans une cuillère en bois ou en porcelaine, donner une goutte de liqueur de Van Swieten, jusqu'à dix à douze gouttes par jour et augmenter jusqu'à vingt ou trente.
3. Faire tous les jours, pendant trois semaines, une friction prolongée dans les aisselles, les aines, etc., changer chaque fois ; recouvrir la partie de ouate ; le lendemain, laver au savon cette même partie, et recommencer la friction en un autre endroit.
4. Contre les accidents de la peau donner, deux fois par semaine, un petit bain avec

Sublimé..... 0 gr. 50 centigr.
Alcool..... 10 grammes.

ajouter à l'eau du bain. Saupoudrer les plaques muqueuses et les excoriations cutanées avec le mélange suivant :

Calomel..... 10 grammes.
Poudre d'amidon..... 200 "

5. Au 4^{me} mois donner le sirop de Gibert à la dose de 20 à 40 gouttes suivant la marche des accidents, même après cessation, une cure mixte intermittente assurera la guérison.

II. Syphilis héréditaire tardive :

1. Avant les repas, donner, suivant l'âge, une cuillerée à thé ou une cuillerée à dessert du sirop suivant :

Iode de potassium..... 5 grammes.
Sirop de gentiane..... 350 "

La liqueur de Van Swieten peut être donnée aux doses suivantes :

De la naissance à 2 ans.....	12 à 30 gouttes.
De 2 à 3 ans.....	30 à 50 "
De 3 à 7 ans.....	50 à 100 "
De 7 à 10 ans.....	1 à 2 c. à thé.
De 10 à 12 ans.....	2 à 3 "
A 12 ans et au-dessus.....	3 à 4 "

Le sirop de Gibert :

De 4 à 6 mois.....	$\frac{1}{4}$ de cuil. à café.
De 6 mois à 1 an.....	$\frac{1}{2}$ "
De 1 an à 2 ans.....	1 "
De 2 à 3 ans.....	$1\frac{1}{2}$ "
De 3 à 5 ans.....	2 "
De 5 à 7 ans.....	3 "
De 7 à 10 ans.....	4 "

En cas de diarrhée persistante remplacer par la friction.

J.-A. LESAGE.