

"une boutonnière cutanée, comme l'enseignait Stoltz, ou inciser
"la peau sur toute la hauteur du pubis, comme le veut Gigli.
"Cette incision devra courir du point d'élection indiqué plus
"haut, jusqu'auprès et un peu à côté du clitoris; alors poussez
"hardiment le passe-seie en arrière du pubis, pénétrant par la
"partie supérieure, rasant le périoste en vous guidant sur l'index
"de la main inoccupée, en place dans le vagin. Lorsque vous
"verrez la pointe de votre passe-seie émerger à l'extérieur, à côté
"du clitoris, fixez-y la scie de Gigli que vous ramènerez en posi-
"tion, tout simplement en retirant votre passe-seie. Enfin, après
"avoir adapté les poignées à la scie, quelques mouvements de va-
"et-vient, sectionneront rapidement l'os pubien. Appliquez quel-
"ques tampons de gaze aseptique sur la plaie, retenus en place
"par quelques lisières de diachylon; faites l'application des for-
"ceps, terminez l'accouchement, puis finalement suturez la peau."

"Quelques auteurs ont recommandé de faire des sutures métal-
"liques osseuses, je me suis contenté de sutures cutanées, et mon
"accouchée a guéri parfaitement, avec consolidation osseuse
"exacte, en moins de deux mois. J'ai simplement appliqué le
"pansement classique sur la plaie, et la traditionnelle ceinture
"autour des hanches et de l'abdomen.

"Je conclurai, Messieurs, en vous affirmant que cette opéra-
"tion est simple facile, et que chacun de vous peut la mener à
"bien."

Ajoutons, pour terminer, que cette observation sur l'hébotomie
est la première qui ait été publiée au Canada, et que le savant
conférencier qui a su intéresser et instruire les membres de notre
Association en est le propagateur.

Cette conférence fut suivie d'une discussion sur les applica-
tions de la scopolamine morphine.

J. L. DUVAL,
Sec.-Trés.