

trées, de la France et qui n'est pas étrangère au Canada où nous l'avons rencontrée et que des médecins avaient faussement appelée une manifestation syphilitique. Cette lésion est toujours bilatérale, c'est-à-dire que les deux commissures des lèvres sont toujours prises. Elle se présente sous un aspect blanchâtre dont l'épithélium est comme macéré et le fond rouge et enflammé. Il y a quelquefois de petites fissures douloureuses surtout quand le malade ouvre largement la bouche. Elle est éminemment contagieuse et proviendrait des eaux stagnantes, des fontaines et des puits.

*Traitement* : Toucher les commissures labiales avec sulfate de cuivre ou alun. Lotions et pommades parasitocides.

*Phthiriasis* : C'est un ensemble de lésions cutanées produites par les poux de tête, du corps et du pubis. Par leurs piqûres, ils irritent la peau et causent une démangeaison souvent intolérable. Les personnes qui portent leurs cheveux longs sans les tenir dans une grande propreté, qui n'observent pas une hygiène préservatrice de leur corps, qui portent des vêtements de dessous malpropres, sont plus exposés à contracter cette affection.

*Siège* : A l'examen, outre les poux que l'on retrouve souvent, l'on observe en arrière du cou, sur la nuque et entre les deux épaules ainsi que sur les parties supérieures des fesses, au-dessus du pli inter-fessier, des lésions du grattage caractéristiques de cette affection.

*Traitement* : Bain. Lotion au sublimé. Couper les cheveux courts. Passer les vêtements à l'étauve.

*Pelade* : Les auteurs ne sont pas encore fixés sur l'origine réelle de cette affection, mais étant contagieuse quelquefois on lui reconnaît dans ces cas une cause parasitaire. On admet aussi une pelade causée par des troubles nerveux et qu'on a appelée trophonévrose, et une autre dont on ignore absolument la cause.

Le diagnostic de la pelade est assez facile à faire. Elle