

brane échancrée ; doigt postérieur représenté par un éperon court.

Le Pétrel Pélagien. *Thalassidroma Pelagica*, Vigors ; *Procellaria Pelagica*, Linn. *Proc. Melononyx*, Nilsson.—Vul. *Le Petit Pétrel* ; Angl. *Stormy Petrel* ; *Mother Carey's Chicken*.—Long. $5\frac{1}{2}$ pouces ; ailes 5 ; queue $2\frac{1}{4}$; bec $\frac{7}{8}$; tarses $\frac{7}{8}$. Bec noir ; dessus d'un noir gris-blanc ; une bande blanche traverse le croupion ; couvertures supérieures de la queue noires à la base, mais avec une large bande noire à l'extrémité. Queue noire avec blanc à la base ; dessous d'un brun sale. Pieds et tarses noirs.

E. C.—De tous les oiseaux pélagiens, les Pétrels sont ceux qui s'éloignent le plus des côtes. Ils ne se rapprochent des terres que pour y faire leur ponte. Leurs nids, composés de plantes marines, sont placés dans des crevasses de rochers, ils ne contiennent d'ordinaire qu'un seul œuf. Le nom de Pétrel leur vient de ce qu'ils ont l'habitude de marcher sur l'eau en s'aidant de leurs ailes, ce qui les a fait comparer à St. Pierre. Leur vol est très rapide et s'effectue presque toujours en planant. Ils parcourent en peu d'heures des espaces immenses. Ce Pétrel est commun à Gaspé, Percé et dans tous le Golfe St. Laurent.

2. Le Pétrel de Leach. *Thalassidroma Leachii*, Bonap. *Procellaria Leachii*, Temm.—Angl. *Leuch's Petrel*.—Long. 8 pouces ; ailes $6\frac{1}{2}$; queue 5 ; bec $\frac{3}{4}$; tarses 1. Bec, pieds y compris les tarses, noirs. La couleur en général est d'un brun sale, plus foncé sur la couronne ; les primaires et la queue d'un brun noir ; couvertures alaires avec les secondaires d'un gris cendré. Queue avec les plumes des côtés et les bords extérieurs des couvertures, blanc. Iris d'un brun foncé.

E. C.—Mêmes habitudes que chez le précédent.

2. Gen. PUFFIN. *Puffinus*, Brisson.

Bec aussi long que la tête, un peu grêle, courbé à l'extrémité, la mandibule inférieure sillonnée latéralement et se courbant aussi à l'extrémité. Narines basilaires, à 2 ouvertures distinctes. Ailes très longues et pointues, la 1ère rémige la plus longue ; queue un peu courte et arrondie. Doigts réunis par une membrane entière, le postérieur remplacé par un ongle ou éperon droit.

Une seule espèce dans notre faune.