

l'enfant par l'allaitement. M. Castaigne a observé, dans la clinique de M. Talamon, un cas de ce genre.

M. Mossé a constaté la transmission du pouvoir agglutinatif de la mère au fœtus, par le placenta.

La réaction agglutinante apparaît dès le septième ou huitième jour de la maladie. Willies et Batlle l'ont constatée *dès le troisième jour* chez deux malades, *dès le quatrième jour* chez un autre. Quelquefois, elle retarde, comme le prouve une observation de Gasser qui ne la constata qu'au vingtième jour.

Les personnes qui ont eu la dothiéntérie peuvent conserver un serum agglutinant pendant plusieurs années ; un ancien typhique donna même la réaction après 27 ans de l'attaque de la maladie.

Comme la réaction peut apparaître tardivement, il est nécessaire de repeter souvent le séro-diagnostic, avant d'affirmer son diagnostic. Un seul examen du serum d'un typhique exposerait à des erreurs nombreuses. " La réaction, dit Widal, peut faire défaut à un premier examen et apparaître le lendemain ou les jours suivants ; elle peut être retardée, aussi n'ai-je jamais cessé de répéter, qu'en présence d'un résultat négatif fourni pas le serum d'un malade suspect, il ne faut jamais négliger de répéter l'examen les jours suivants.

* * *

Ehrlich découvrit en 1882, la réaction diazoïque des urines. Ce phénomène remarquable est un des signes les plus constants de fièvre typhoïde, et se manifeste principalement entre le cinquième et le vingt-unième jour de la maladie. Nous étudierons tout au long ce procédé, qui ne regarde pas l'analyse microscopique, dans un travail que nous devons publier sur l'examen des urines au point de vue du diagnostic des maladies infectieuses.

Le b
muqueux
mésentér
tion de la
vivant, on
La prem
que et m
tisfaction

Le b
d'aniline,
de méthyl
coloration
ploie la m

Les
aussi la f

Le b
plus ; no
Strauss,
certaines
pour le p

(1 Mét
10 On
let de genti
20 On l
nares, et ulc
30 On c
nitrique à 3
une teinte g
40 On p
miné au mic
lorante du G
bleu.