

laissé en place au moyen duquel on fit toutes les six heures l'aspiration des liquides accumulés dans la cavité pelvienne.

Sur les cinq cas rapportés par l'auteur il y a eu deux morts : l'une survint au bout de six semaines, l'autre au bout de quinze jours : dans les deux cas il s'était produit une ulcération le long de la ligne des sutures. Malgré ces deux insuccès, l'auteur considère que l'excision constitue la méthode de choix. Il insiste sur la nécessité d'opérer le plus tôt possible et il attache une importance capitale à la toilette du péritoine. Quand la perforation s'est produite il y a quelque temps ou quand elle s'est produite l'estomac étant plein d'aliments, on fera des lavages au sérum en procédant comme il est dit plus haut. Dans les cas récents, surtout si l'estomac était vide au moment de la perforation, il suffit en général d'éponger soigneusement.

L'auteur conseille enfin d'opérer au domicile même du malade pour peu que la disposition du logement s'y prête : dans le cas contraire, on n'hésitera pas à transporter le malade à l'hôpital, à condition de l'opérer dès son arrivée.

---

## LA MENOPAUSE

PAR M. LE DOCTEUR PAUL HUGUENIN

Très redoutée, en général, par les femmes, la ménopause, encore appelée "âge critique" ou, "retour d'âge," est cette période critique pendant laquelle les époques menstruelles diminuent, puis disparaissent ; c'est la fin de la vie génitale chez la femme et, ne leur en déplaise, c'est le commencement du vieillissement, qui marque la terminaison des fonctions sexuelles et la cessation de toute faculté conceptionnelle.

Certes, c'est avec raison que les femmes redoutent ce stade dangereux de leur existence ; beaucoup ne doublent pas sans encombre ce cap hérissé d'écueils. Nous allons passer en revue les principaux de ces écueils et indiquer, chemin faisant, les moyens les plus efficaces pour éviter d'y sombrer.

APERÇU PHYSIOLOGICO-PATHOLOGIQUE DE LA MÉNOPAUSE. Toute femme doit normalement cesser d'avoir ses écoulements sanguins mensuels vers 45 ou 50 ans, en moyenne. C'est un fait d'observation indiscutable et toutes celles qui dérogent à cette règle physiologique constituent des exceptions plus ou moins mor-