

conides, il n'y en a jamais qu'une; la 2e faisant défaut; la cellule *f* de la fig. 29 se trouve alors ouverte en dehors.

Clef systématique pour la distinction des genres.

N. B. Si la réponse à chaque proposition émise suivant le chiffre d'ordre à gauche est affirmative, passez au numéro suivant, jusqu'à ce que vous rencontriez un nom de genre; mais si cette réponse est négative, il faut passer au numéro indiqué par le chiffre dans la parenthèse pour continuer le même procédé.

- 1(51) Abdomen sessile et déprimé dans toute sa longueur, ou seulement comprimé à l'extrémité; tarière généralement longue,

PIMPLIDES.

- 2(5) Dos du mésothorax ridé en travers;
 3(4) Abdomen poli, lisse, non aciculé transversalement 1. *THALESSA* (1)
 4(3) Abdomen aciculé transversalement....2. *RHYSSA* (2)
 5(2) Dos du mésothorax non ridé en travers;
 6(18) Abdomen avec impressions ou tubercules sur ses segments;
 7(17) Impressions de l'abdomen transversales;
 8(11) Tarière plus longue que le corps;
 9(10) Segments abdominaux relevés au milieu à leur bord antérieur et postérieur..... 3. *EPHIALTES* (3)

(1) *THALESSA*, Holmgren.—Insectes de grande taille; tarière très longue; dos du mésothorax ridé en travers. Abdomen lisse, non aciculé transversalement. Ailes avec une aréole triangulaire.—Volume V, page 446.

(2) *RHYSSA*, Gravenhorst.—Diffère seulement des *Thalessa* par l'abdomen qui est tout aciculé en travers.—V, 449.

(3) *EPHIALTES*, Gravenhorst.—Corps long et droit; tarière ordinairement plus longue que le corps. Une aréole triangulaire. Segments abdominaux tuberculeux et relevés au milieu en avant et en arrière.—V, 449; VII, 140, 312.