

l'une de celles qui présente les conséquences les plus graves par rapport à la vie de l'enfant.

L'évacuation des matières fécales ne pouvant avoir lieu, il s'ensuit une obstruction intestinale qui entraîne la mort de l'enfant dans un bref délai.

L'imperforation de l'anus est une affection plutôt rare. D'après les auteurs il en existerait un cas sur 16,000 enfants.

On peut en rencontrer plusieurs variétés: souvent l'anus est tout simplement fermé par une mince membrane et l'ampoule rectale est située directement au-dessus.

Quelquefois il n'y a pas d'anus et l'ampoule rectale est plus ou moins haut placée; enfin dans certains cas l'anus existe et bien conformé, mais sans communication avec l'ampoule rectale.

Il est rare que l'imperforation soit reconnue immédiatement après la naissance de l'enfant, le médecin ou la garde-malade ne songeant pas à regarder s'il existe ou non un anus perméable. Et ce n'est que quelque temps après qu'on s'aperçoit que l'enfant ne rend pas de méconium malgré ses efforts d'expulsion; c'est alors qu'on voit s'installer les différents symptômes de l'obstruction intestinale qui d'ordinaire amène la mort vers le sixième jour, à moins qu'une rupture intestinale ne vienne la hâter. On rencontre cependant des enfants qui résistent douze ou treize jours avant de mourir. Le diagnostic est, comme on le voit chose facile à faire, et le médecin n'a qu'à regarder pour constater s'il existe un anus perméable ou une imperforation.

Connaissant les conséquences fatales de l'imperforation de l'anus, il est évident que la seule chose à faire est de créer, comme le dit Trélat, une voie pour l'évacuation des matières, et cette voie devra se trouver à l'anus même ou tout près. Quelquefois par suite de la situation trop haute de l'ampoule rectale, il est impossible de créer cette voie à l'anus; il ne reste plus d'autre alternative que celle de faire un anus artificiel dans la fosse iliaque,