

DE LA NECESSITE DE L'EXAMEN DU CANAL GENITAL DANS LES INFECTIONS PUERPERALES.

Par le Dr JOSEPH-E. LANOIE,

Accoucheur et Gynécologue à l'Hôpital de Fall River, Mars.

Je vous présente une malade dont l'histoire servira à démontrer toute l'importance de faire un bon examen de la muqueuse vaginale dans tous les cas de fièvres puerpérales. J'ai examiné plusieurs femmes en consultation avec des confrères, en pratique générale, et je regrette de dire que, la plupart du temps, ceux-ci avaient complètement négligé de s'assurer, par un examen attentif, s'il n'y avait pas de surface infectée au ulcérée de la muqueuse du vagin. Très souvent aussi on avait fait le curetage de l'utérus et laissé sans traitement ces petites plaies du vagin qui étaient les portes d'entrée de l'infection. L'importance pratique de ce sujet et l'embarras du traitement chirurgical, dans un grand nombre de cas de fièvres puerpérales, m'ont induit à présenter cette observation.

Mrs. Madame J., multipare, âgée de 32 ans, est accouchée le 4 septembre, 1904. Accouchement normal. Son médecin n'a rien observé d'anormal avant la dixième journée, alors qu'il a constaté un écoulement sanguin assez considérable. La température le matin, à ce moment, était de 101° F.; le pouls à 85. Durant les neuf jours suivants la température avait varié de 102° F. à 105° F.; le pouls n'avait jamais dépassé 100 mais il y avait eu des frissons. Pas de féridité des lochies. L'utérus fut cureté trois fois et, chaque fois, le curetage fut suivi d'une douche d'eau chaude bouillie. Par ces moyens, cependant, on ne réussit à sortir que quelques petits caillots.

J'ai été appelé auprès de cette femme la vingtième journée après son accouchement. La température était de 105½° F; le pouls à 142.

La douleur dans la région de l'ovaire gauche était si intense qu'il me fut impossible de faire un examen satisfaisant. Cependant, j'ai pu constater de l'infiltration du ligament large gauche, une augmentation de volume de l'ovaire et de la trompe gauche, et le doigt sentait une ulcération à la base du ligament large et une autre au-dessus du muscu de tanche. Il n'y avait