

Traitement de l'entérite cholériforme chez les enfants (CAYLA).

Le Dr Cayla conseille d'ajouter au lait additionné d'eau de chaux, aux lavements amidonnés, à l'eau albumineuse, les deux potions suivantes qui seront administrées alternativement d'heure en heure par cuillerée à café :

1° Teinture de noix vomique III gttes.
Sirop de ratanhia I once
Sirop de coings..... I once
Eau distillée..... I once et demie

Mélez.

2° Bromure de potassium.... 10 grains
Sirop de belladone I once
Sirop de menthe I once
Eau distillée..... 1½ once

Mélez.

La noix vomique relève la contractilité de la fibre musculaire, le coing et le ratanhia agissent comme astringents ; le bromure de potassium et la belladone arrêtent la sécrétion exagérée des glandes de l'appareil gastro-intestinal.

Dans les vingt-quatre heures le vomissement s'arrête, la diarrhée diminue et au bout de deux à trois jours la guérison est assurée.

(*Revue Médico-Chirurgicale des maladies des femmes*).

Poudre contre le chancre phagédénique de la vulve.

M. Terrillon conseille dans ce cas l'emploi de la poudre suivante :

Acide pyrogallique..... 2½ drachmes
Poudre d'amidon..... 1¼ once

Mélez.—Dans les cas de chancre phagédénique de la vulve, avec des anfractuosités à prolongements multiples, on insuffle cette poudre au moyen d'un soufflet dans les profondeurs de la plaie. Les pansements sont renouvelés deux fois par jour —La poudre doit être fraîche et conservée dans un flacon bien bouché.—(*Gaz. de Gynécologie*.)

Topique contre les cors.

A. salicylique..... 18 grains
Extrait alcoolique de cannabis indica... 10 do
Alcool à 90°..... 18 do
Ether à 62°..... 40 do
Collodion élastique..... 1 once

Conserver dans un flacon bien bouché.

Application avec un pinceau tous les deux jours, pendant une semaine.