

Labrador. (*Norton.*) La grive solitaire se rend en nombre dans Terreneuve. (*Reeks.*) Elle abonde pendant l'été à Halifax, Nouvelle-Ecosse. (*Downs.*) Elle passe l'été en grand nombre dans la Nouvelle-Ecosse. (*H. F. Tufts.*) On en a remarqué un spécimen le 23 octobre 1902, sur l'île Sable, Nouvelle-Ecosse, à la suite d'une tempête. Au même endroit on a observé cette espèce en nombre le 25 mai 1904. On en a vu deux spécimens le 22 octobre 1905, ainsi que de nombreux autres le 24 mai 1906; il y en avait beaucoup le 5 novembre de la même année, à la suite d'une forte tempête, et en 1907, on en a vu quelques-uns le 24 octobre ainsi que plusieurs autres le 1er novembre. (*J. Boutelier.*) Cette espèce était apparemment commune, au mois de juillet 1888, dans les bois à la pointe Brackley, île du Prince-Edouard, et assez commune, en 1808, sur l'île du Cap-Breton. (*Macoun.*) Elle couve en abondance aux alentours de St. John, Nouveau-Brunswick. (*Chamberlain.*) Elle se reproduit en abondance à Scotch Lake, comté d'York, Nouveau-Brunswick. (*W. H. Moore.*) On l'observe partout dans la vallée de la Restigouche Nouveau Brunswick. (*Brittain et Cox.*) Elle est un peu plus nombreuse que la grive de Swainson sur l'île du Prince-Edouard. (*Dwight.*) Elle se voit en grand nombre, et elle couve, dans la plupart des îles du groupe Madeleine. (*Bishop.*) Cette grive abonde sur l'île d'Anticosti ainsi que partout le long de la rive nord du St-Laurent. (*Brewster.*) Elle est assez commune au lac Mistassini, dans la province de Québec, où elle couvait au mois de juin 1885. (*J. M. Macoun.*) Elle passe l'été sur l'île de Montréal, y couvant dans la ville ainsi que dans le parc Mont-Royal. Elle est la grive la plus commune ici. Le 24 mai 1885 j'ai trouvé un nid, contenant quatre œufs couvés, qui appartenait à cette espèce. Il était situé sur un monticule herbeux, dans un petit bois à St-Bruno. (*Wintle.*) Cette espèce est commune en été dans certaines localités dans l'est de la province de Québec. (*Dionne.*)

La grive solitaire passe l'été aux alentours d'Ottawa. (*Ottawa Naturalist*, vol. V.) J'ai entendu son ramage très souvent sur les îles de la Madeleine, et je l'ai trouvée elle-même en train de couver près de Lansdowne, Ontario, ainsi que sur l'île Wolfe près de Kingston, Ontario. (*Rév. C. J. Young.*) En été elle habite ordinairement les districts de Parry Sound et Muskoka. Le 17 mai 1897 j'ai recueilli un nid, contenant quatre œufs, situé au milieu des feuilles desséchées au pied d'un arbuste de bois de fer mort. (*J. H. Fleming.*)