

MEMOIRES

DIAGNOSTIC DE LA LUXATION CONGENITALE DE LA HANCHE

Les transformations accomplies dans le traitement de la luxation congénitale de la hanche ont été considérables. Après avoir cru à l'incurabilité de cette malformation, on s'est acharné à vouloir la traiter par des méthodes sanglantes, mais les succès ont été presque aussi nombreux que les tentatives. Nous ne mentionnons pas nombre d'accidents qui ont été de véritables désastres.

Depuis quelques années, la curabilité de cette luxation n'est plus mise en doute ; elle est basée sur des preuves certaines et indéniables qui sont cliniques, anatomiques et radiographiques, et les orthopédistes sont fiers des résultats merveilleux qu'ils obtiennent chaque jour par la méthode non sanglante.

La luxation congénitale de la hanche est fréquente en Europe, moins au Canada, mais malheureusement il en existe encore un grand nombre de cas et elle n'est pas toujours reconnue et traitée d'une façon convenable.

Nous avons cru utile de repasser brièvement sa symptomatologie qui d'ailleurs est bien définie et dont les éléments sont faciles à dépister.

Les statistiques sont unanimes à proclamer la plus grande fréquence de la lésion dans le sexe féminin ; ainsi donc les ma-