

b) Anesthésie loc. : adrénaline $\frac{1}{2}$ milligr., chl. cocaïne 1 centigr. ; 1 à 2 cc. immédiatement avant opération.

Alypine (nom déposé). — *Chlorhydr. de benzoyltétraméthyldiamionéthylméthylcarbinol*. — S. eau. — *P. T. et Ind.* ; Anesthésique loc. moins toxique que cocaïne. Non mydriatique, non vaso-constricteur. — *Pos.* : 1 à 2 cc. sol. à 1%. — Inject. hypo ou intradermique.

Antipyrine. — *Phényldiméthylpyrazolone*. — S. eau. — *P. T.* : Analgésique, antithermique, hémostatique. — *Ind.* : Névralgies ; peu employée en hypodermie à cause des douleurs vives qu'elle peut occasionner ; solvant du chlorhydr. bas. de quinine. — *Pos.* : 25 à 50 centigr. par 24 h. — Inj. sous-cut. et intram.

Apocodéine. — *Prod. de déshydratation de codéine*. — *F. us.* : Chlorhydrate. — S. eau. — *P. T.* : Vomitif. — *Pos.* : $\frac{1}{2}$ à 2 centigr chez adulte. — Inj. sous-cut. — *Peu usité*.

Apomorphine. — *Prod. de déshydratation de morphine*. — *F. us.* : Chlorhydrate, — S. eau. — *P. T.* : Vomitif énergique mais dangereux. — *Ind.* : Empoisonnements. — *Pos.* : 5 à 15 milligr. chez adulte ; 1 à 6 milligr. chez enfant. — *Non douloureux*.

Aristol. — *Thymol biiodé*. — Ins. eau. — *P. T.* : Antiseptique peu toxique. — *Ind.* : Tuberculose pulm. — *Pos.* : 10 à 40 centigr. par 24 h. en sol. huileuse. — *Très douloureux*. — *Peu usité*.

ARGENT :

Chlorure d'argent. — Ins. eau. — S. dans sol. hyposulfite de soude. — *P. T. et Ind.* Antiseptique préconisé dans tabes. — *Pos.* : 6 à 12 milligr. par 24 h. Conserver à l'obscurité. — *Peu usité*.

Argent colloidal chimique. — (Syn. : *Collargol*). Variété d'Ag métallique obt. par réduction du nitrate d'Ag en sol. étendue par un sels ferreux. — Contient 97% d'Ag, du fer et de l'ammoniaque. Donne avec l'eau, sol. colloïdales précipitables par chaleur, sels et acides. — *P. T.* : Antiseptique non toxique. — *Ind.* : Toutes maladies infectieuses localisées ou généralisées. — *Pos.* :