Très rapproché du similaris, Prov., en différant par les caractères suivants: face sans lignes orbitales roussâtres; antennes plus courtes, plus grêles, non enroulées; aréole du métathorox en carré, celle du similaris étant beaucoup plus large que haute; pattes postérieures en partie noires; tuille plus petite.

## 83. Ichneumon très-noir. Ichneumon aterrimus, n. sp.

n.

de

un

nn

sul

ble

po

l'al

de

et

sou Po

tac

déj

Ot

qu'

bit

tac

bo

de

ve

de

E

th

er

le

ai ei

A

p

Q—Long. 45 pce. Entièrement noir, avec un large anneau jaune aux antennes. Les pattes de devant blanchâtres en avant. Antennes grenues, à articles courts. Thorax finement ponetué. Aréole centrale du métathorax en carré, bien distincte. Corps court et robuste. Abdomen à post-pétiole finement ponetué et non aciculé, les gastrocelles peu prononcés.—Toronto (Geddes).

Se distingue de l'ater par ces gastrocelles peu distincts et de l'apertus par son absence de taches et son post-pétiole non aciculé.

## 84. Ichneumon d'Ontario.—Ichneumon Ontariensis, n. sp.

Q—Long. 52. pce. Noir et jaune; la face, les mandibules, les orbites antérieurs et postérieurs, le scape des antennes en dessons, le collier, les écailles alaires, une petite ligne en avant et une autre en dessons, l'écusson, 2 taches sur la face postérieure du métathorax, les pattes en partie avec un anneau à tous les segments abdominaux, jaune. Thorax finement ponctné; aréole centrale du métathorax en carré. Ailes hyalines-jaunâtres, le stigma fauve. Pattes jaunès, les 4 hanches antérieures en dessus, les postérieures e dèrement, leurs enisses avec l'extrémité de leurs jambes, une ligne en dehors sur les 4 cuisses antérieures, noir, tarses postérieurs, brun plus on moins foncé. Abdomen allongé, noir, tous les segments, excepté le 3e, avec une ligne jaune au sommet, le 3e jaune avec une ligne noire à la base, le segment terminal roussâtre, ou noir marginé de roussâtre. Le post-pétiole très finement aciculé.—Toronto (Geddes).

Bien distinct de tous ses voisins par sa coloration qui, quoi que variable, conserve toujours le 3e segment abdominal jaune avec une ligne noire à la base, et le 2e noir avec une ligne jaune au sommet.