

prescrivent habituellement sous forme de prises, de cachets ou de pilules. Si la prise est insipide, soluble et non effervescente, on la délaye simplement dans un peu d'eau ; la poudre effervescente demande beaucoup d'eau, un demi ou deux tiers d'un grand verre. S'il s'agit d'une prise insoluble, ou d'un goût désagréable, on peut, dans le premier cas seulement, la mettre sur la langue comme le calomel, mais il vaut mieux, et dans le second cas c'est une nécessité, l'envelopper d'une gaufre de papier de riz (*wafer*), d'un morceau de pain azyme (hostie) ou d'un cachet. Après avoir humecté légèrement la gaufre ou le pain azyme, on l'étend sur la cuiller, puis, plaçant la poudre bien au centre, on replie les bords par dessus et l'on porte au fond de la bouche en faisant suivre d'une gorgée d'eau. Le *cachet* est préparé d'avance ; le moment venu de l'administrer, on le dépose à la surface d'un verre d'eau et, au moment où il va plonger, on le cueille ainsi qu'un peu d'eau avec une cuiller et on le fait prendre sans le toucher avec les doigts. La *pilule* doit être déposée à la base de la langue et avalée avec une gorgée d'eau ; elle doit être avalée toute ronde et non machée, ce qui, chez certaines personnes, chez les enfants surtout, offre parfois des difficultés presque insurmontables. On essaie alors de faire prendre la pilule dans une cuillerée d'eau, de confitures, de gelée, on l'enveloppe d'un morceau de mie de pain pour grossir son volume, on la dissimule dans un pruneau dont le noyau est enlevé ; si malgré tout le pharynx du malade reste réfractaire, il faut écraser la pilule et l'administrer comme une prise.

*Liquides.*—Les *potions*, les *sirops*, les *préparations magistrales* s'administrent suivant la direction marquée ; c'est au médecin à indiquer la quantité à donner, l'intervalle des doses, la distance des repas et s'il est nécessaire ou non de réveiller le malade pour lui faire prendre son remède. D'une manière générale, un médicament prescrit avant le repas se donne de 20 à 30 minutes avant, et après le repas tout de suite ou 15 minutes