

Causes.—Elles sont très nombreuses: les mauvais traitements, les coups, les travaux fatiguants, les chocs contre les portes, la mauvaise nourriture, la peur, l'alimentation trop riche qui engendre la pléthore peuvent produire l'avortement.

Symptômes.—La jument a des coliques plus ou moins violentes, elle gratte du pied, se couche, se relève, elle ne mange pas, elle fait des efforts et il faut souvent lui aider surtout quand le travail est lent.

Traitement.—Dans tous les cas il faut de bons soins, un endroit calme, de la paille en abondance et des couvertures. On donnera des tisanes de graines de lin, des boissons farineuses tièdes. Ne pas oublier de bouchonner fréquemment la malade. Il faut désinfecter la matrice avec du crésyl 1% ou du permanganate de potasse 2%.

Il faut écarter de la reproduction les juments qui ont avorté, car le fait se reproduit une deuxième et souvent une troisième fois, à moins qu'on tienne beaucoup à la jument pour sa conformation ou sa généalogie.

Parturition ou mise-bas

Presque toujours la jument accouche seule. Quelquefois l'accouchement ou part est contre nature, quand le fœtus est trop gros, mal placé ou que le bassin de la jument est mal conformé; dans ce cas, il faut appeler un vétérinaire.

En général le fœtus tombe sur le sol et le cordon ombilical se rupture près de l'abdomen; s'il n'est pas rompu, il faut le lier près du ventre et le couper à une longueur de deux pouces. Si le part est languissant c'est-à-dire quand la mère est affaiblie on administre quelques bouteilles de bière avec un tiers d'onc. d'ergot de seigle. On bouchonnera la jument qu'on laissera en liberté avec de la paille en abondance et on lui donnera des boissons farineuses chaudes.