

M.—Diviser en 40 pilules. Prendre 2 à 4 pilules par jour, une demi-heure avant les repas, ou trois heures après. On ne prendra jamais qu'une seule pilule à la fois et l'on augmentera d'une chaque jour jusqu'à ce qu'on soit arrivé au chiffre maximum de 6 pilules par jour, c'est-à-dire à $\frac{1}{12}$ gr. à peu près.—*Scalpel*.

Prurit anal.—*Allingham*.

R—Liq. carbonis deterg. (Wright's).....	} aa ̄i
Glycerini.....	
Pulv. zinci oxid.....	} aa ̄ss
Pulv. calamin. præp.....	
Pulv. sulph. præcip.....	̄ss
Aquæ ad.....	̄vi

M.—En badigeonnages, matin et soir.

Prurit vulvaire.—*Tilbury Fox*.

R—Sod. hyposulphit.....	̄ii
Glycerini.....	̄i
Aq. destill.....	̄iii

M.—En lotions.

Plaies contuses.—*Dr D. C. Henson*.

R—Sodæ hyposulphit.....	̄iv
Acid. carbol. cryst.....	̄ss
Glycerinæ.....	̄ii
Aquæ.....	Oi

M.—En lotions et compresses.—*Canadian Practitioner*.

Ulcères atoniques.—*Plettinck*.

R—Axonge.....	30 parties
Précipité rouge.....	10 "

M.—Pour pansements quotidiens.—*Revue de thér. méd. chir*.

Solution résolutive.—*Descroizilles*.

R—Sod. chlorid.....	̄i ̄ii
Magnes. sulph.....	̄ss
Tinct. iodin.....	m xx
Aquæ.....	̄v

M.—En applications dans les engorgements strumoux infantiles.—*Revue de thér. méd. chir*.

Emulsion d'huile de foie de morue.—*Hôpital Roosevelt, N.Y.*

R—Ol. morrhue.....	̄ii
Glycerinæ.....	̄i
Pulv. g. acaciæ.....	̄i
Aquæ.....	q.s.ad ̄ss

A prendre en une seule dose trois fois par jour.—*Druggists' circular*.