Donnez un purgatif salin : 1 once de sulfate de soude dans une infusion de $2\frac{1}{2}$ drachmes de séné et entretenez ensuite la liberté des intestins en donnant tous les jours une pilule contenant $\frac{1}{2}$ grain de podophyllin et $\frac{1}{8}$ de grain d'extrait de belladone, ou mieux :

Poudre de rhubarbe.....	1 grain.
Poudre d'aloès.....	1 "
Extrait de belladone.	$\frac{1}{8}$ de grain.

M.—Pour une pilule. Dose : une ou deux pilules par jour, selon l'effet.

Eczéma.

Voici le traitement constitutionnel préconisé par le Dr Robert M. Simon, dans ses *leçons sur les maladies communes de la peau*. WOOD'S MEDICAL AND SURGICAL MONOGRAPHS, vol. I, No 1.

L'arsenic aggrave les symptômes de l'eczéma aigu, tandis qu'il est de la plus grande utilité dans la forme chronique, lorsqu'il y a infiltration du derme et épaissement de l'épiderme.

Sous quelque forme qu'on donne l'arsenic, on doit l'administrer pendant ou immédiatement après les repas.

L'acide arsénieux se donne en pilules.

Acide arsénieux.....	$\frac{1}{30}$ à $\frac{1}{12}$ de grain.
Extrait de gentiane.....	1 grain.

Pour une pilule. Deux fois par jour.

Ou la liqueur de Fowler, à la dose de 3 gouttes 2 ou 3 fois par jour.

Si on obtient un bon résultat on augmente la dose de la liqueur jusqu'à 10 gouttes trois fois par jour. On doit en suspendre l'usage s'il produit des coliques, de la diarrhée ou de l'irritation des yeux et de la muqueuse nasale.

* * *

Chez les scrofuleux, huile de foie de morue ; chez les goutteux, iodure de potassium à petites doses.

Chez les enfants affectés d'*eczéma subaigu*, lorsqu'il existe beaucoup d'irritation, Piffard et autres dermatologistes donnent le sulfure de calcium à la dose de $\frac{1}{30}$ à $\frac{1}{15}$ de grain.

“ Aussi, dans les cas arrivés à la seconde période, lorsque l'exsudation est abondante et purulente, on le donne aux enfants à la dose de $\frac{1}{30}$ de grain, et aux adultes à celle de $\frac{1}{8}$ de grain.

On le donnera avec beaucoup d'avantage lorsque les plaques éruptives sont très infiltrées et que l'inflammation revêt un caractère subaigu.