

Travaux originaux

DES TUMEURS BENIGNES DE LA RÉGION SUS-HYOÏDIENNE.—LIPOME PROFOND (1)

Par le Docteur ARTHUR SIMARD

Professeur de pathologie externe
Chirurgien de l'Hôtel-Dieu.

Le malade que vous venez d'examiner va nous fournir l'occasion d'étudier ensemble, la question intéressante et de pratique journalière du diagnostic des tumeurs dites bénignes de la région sus-hyoïdienne.

J. G., cultivateur âgé de 29 ans, n'offre rien d'intéressant dans ses antécédants héréditaires et personnels. Il a toujours joui d'une florissante santé et à l'heure actuelle, à part l'existence d'une tumeur située à la partie supérieure et latérale gauche au cou, l'examen des différents organes ne dénote rien d'anormal. Le tumeur aurait débuté insidieusement il y a près de deux ans. A cette époque elle pouvait avoir la grosseur d'une petite noisette. Depuis, elle a graduellement augmenté de volume sans douleur, ne causant qu'un peu de gêne et aujourd'hui elle a acquis les dimensions d'un œuf de poule.

Il faut retenir dès maintenant, car nous en aurons besoin tout à l'heure, la progression lente, graduelle, sans poussées inflammatoires de cette tumeur et son indolence constante. Elle n'est gênante que par son volume et sa situation.

L'examen direct donne le résultat suivant : A la partie

(1) Clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu, décembre 1907.