

Ferme expérimentale de Brandon, Man.

Il a été cultivé à Brandon quatre variétés de blé durum. Elles ont été semées le 10 mai à raison d'environ un boisseau trois quarts de semence à l'acre.

N ^o	Variétés essayées.	Produit moyen	Période moy- enne.	Produit en 1907	N ^o	Variétés essayées.	Produit moyen	Période moy- enne.	Produit en 1907.
	(Cinq ans.)	bois. lb.	jours.	bois. lb.		(Moins de 5 ans.)	bois. lb.	jours.	bois. lb.
1	Gozo	49 52	128	44 20	3	Charnovka (4 ans)	48 25	126	39 40
2	Roumanie	48 ..	127	45 40	4	Mahmoudi (4 ans)	44 10	127	39 ..

Le rendement moyen des quatre variétés de blé durum essayées à la ferme expérimentale de Brandon en 1907 a été 42 boisseaux 10 lb par acre.

AMIDONNIER ET ÉPEAUTRE

Nous faisons rapport ici sur deux variétés d'amidonnier et deux d'épeautre. Elles ont été semées le 10 mai à raison d'environ 120 lb. de semence à l'acre.

N ^o	Variétés essayées.	Produit moyen.	Période moy- enne.	Produit en 1907.	N ^o	Variétés essayées.	Produit moyen.	Période moy- enne.	Produit en 1907.
	(Quatre ans.)	lb.	jours.	lb.		(Quatre ans.)	lb.	jours.	lb.
1	Amidonnier commun	3,405	126	2,820	3	Amidonnier roux	2,552	130	1,930
2	Epeautre blond	2,635	129	1,940	4	Epeautre blanc	1,995	129	1,720

Le rendement moyen des quatre variétés d'amidonnier et d'épeautre essayées à la ferme expérimentale de Brandon en 1907 a été 2,103 livres par acre.