

de l'orbite. M. le Dr Foucher s'est contenté d'en enlever une, en entier, et la pointe seulement de deux autres sont restées. Une cautérisation des surfaces d'implantations, puis l'enlèvement de la glande lacrymale à cet endroit.

Restait à curetter l'ulcération des culs-de-sac conjonctivaux, et à remédier à l'épiphora inévitable, vu que les conduits lacrymaux étaient oblitérés. C'était en même temps remédier à la conjonctivite.

Une incision à l'angle interne de la paupière inférieure mettait à nu l'ulcération du cul-de-sac conjonctival. Là l'épithélioma, à notre surprise, s'étendant beaucoup plus loin que nous ne pensions. Il fut cureté énergiquement et cautérisé ensuite, et l'intervention se terminait par une autoplastie afin de donner plus d'ouverture à la fente palpébrale rétrécie par la cicatrice.

La plaie a été tamponnée à la gaze aseptique, laissée ainsi béante pour transformer les lésions profondes en des lésions superficielles pour les rayons X, vu que rien désormais ne s'interposait

Les premières séances ont été données à travers le pansement, ayant eu soin d'employer la gaze aseptique au lieu de la gaze iodoformée qui intercepte les rayons.

Le lambeau s'est rétracté en un petit mamelon rouge que nous avons fait cauter d'un coup de ciseaux, tel qu'indiqué par la flèche.

En somme, opération bien économe, bien conservatrice, bien incomplète, et qui, à coup sûr, par elle-même ne pouvait avoir la prétention d'être curative.

La méthode chirurgicale ayant pour principe d'enlever tout le mal sans s'occuper de la façon dont cela se réparera, de considérer l'économie comme nuisible dans l'espèce, d'enlever le plus largement possible tout ce qui paraît malade ou simplement suspect, eut été forcée de faire un traumatisme beaucoup plus considérable. Les deux paupières, les sacs lacrymaux et l'orbite étaient envahis.

C'est un traumatisme, une défiguration énorme qu'il eut fallu produire.

Vous voyez, par comparaison, combien plus humaine a été l'opération de M. le Dr. Foucher, et combien supérieure au point de vue esthétique de la réparation.

Les rayons X qui ont précédé et suivi cette petite intervention lui ont permis par leur concours de ne s'attaquer qu'au néoplasme, tandis que la méthode chirurgicale lui eut fait ici un devoir d'en-