Bronchite aiguë à la première période (congestive). (MARTINET).

- 1° Combattre la congestion par l'application de cataplasmes sinapisés, les enveloppements humides du thorax, les bottes d'ouate aux jambes, les bains chauds (38°), suivant l'intensité de la congestion bronchique.
- 2° Calmer la toux (inutile à cette période) et favoriser l'établissement de l'expectoration (pasage à la période de coction) par administration associée de calmants (aconit, eau de laurier-cerise, codéme, bromoforme) et d'expectorants (kermès, polygala, oxyde blanc d'antimoine, benzoate de soude).

Par exemple:

Alcoolature de racines d'aconit	30 g.
Eau de laurier-cerise	8 gr.
Benzoate de soude	8 —
Sirop de cod'ine	50 —
Sirop de polygala	50
Sirop de Tolu	50 -

Quatre cuillerées à soupe dans les vingt-quatre heures, en dehors des repas, dans une tasse de tisane pectorale (potion pour deux jours).

3° ('ombattre, s'il y a lieu, l'infection générale et la fièvre par un purgatif salin et un antipyrétique:

Antipyrine	0	gr.	02	
Bichlorhydrate de quinine	0	ør.	30	

Pour cachet n° 2.

Un cachet, le premier et le deuxième jour, vers deux heures de l'après-midi, avec une tisane d'infusion chaude.

4° Combattre la sécheresse irritante de l'air. Faire bouillir près du lit du malade, de l'eau additionnée de feuilles d'eucalyptus et de teinture de benjoin.

L'huile de ricin comme laxatif.

L'huile de ricin est plus efficace lorsqu'on l'associe à de la glycérine.