

j'ai signalées et qui commande une modification dans la méthode.

Des cas que j'ai observés, il résulte des conclusions favorables que je pense devoir formuler nettement et de la façon suivante :

1. L'*antipyrine* ou *analgésine* est le médicament de choix à opposer aux diverses espèces de diarrhée infantile ;
2. Elle agit surtout dans les formes dyspeptiques, douloureuses et réflexes ;
3. Elle est absorbée et supportée le plus souvent avec la plus grande facilité et mérite de remplacer les autres remèdes antidiarrhéiques ;
4. Son mode d'action se rapproche physiologiquement de celui de la morphine, médicament inapplicable en pareil cas ;
5. Aucune contre-indication n'existe à son emploi, sauf de ne pas dépasser les doses compatibles avec le jeune âge des sujets.

*Bulletin Médical.*

## FORMULAIRE.

### Potion contre l'entérite.

Sous-nitrate de bismuth. .... de 0 gr. à	2 grammes.
Eau de chaux.....	20 “
Hydroolat d'anis.....	40 “
Sirop diacode.....	5 “
Sirop de gomme.....	25 “

F. s. a. une potion à donner, par cuillerée à café, aux enfants atteints d'entérite.—Dans le cas d'entérite chronique, on administre un ou deux paquets par jour de la poudre suivante :

Alun pulv.....	3 grammes.
Opium pulv.....	0 gr. 01 cent.
Sucre pulv.....	5 grammes.

Mêlez et divisez en vingt paquets.—N. G.

(*L'Union Médicale.*)

### Injection contre la blennorrhagie aigue.

M. P. THIERRY.

Iodoforme.....	10 grammes.
Huile d'amandes douces... 60	—
Vanilline ou coumarine... Q. S.	
Mêlez. — Pour injections dans l'urèthre.	