

Natices fauve, *Natica spadicea*.

Presque globuleuse, solide, fauve pâle; l'intérieur blanc; l'extrémité bleuâtre; la gorge avec des fascies latérales, et le dos blanc.

Nerita spadicea. — *Chemn. Conch.* 5. tab. 187. fig. 1872 et 1873. et 188. fig. 1896. a. b. et 1897.

Se trouve sur les côtes de l'île de la Réunion.

Natices rousse, *Natica rufa*.

Roux clair, l'ombilic plus coloré; le bord et la base du dos des spires fasciés de blanc; la gorge avec une fascie roussâtre, et la columelle avec une bande brune.

Nerita rufa. Linn. — *Rumph. Mus.* tab. 22. fig. D. *Chemnitz*, 5. tab. 187. fig. 1874, 1875.

Se trouve sur les côtes de l'île de la Réunion.

Natices gochet, *Natica fulminans*.

Presque globuleuse, avec des lignes en zigzags, d'un fauve pâle; l'apophyse à sommet applati.

Nerita fulminea. Linn. — *Lister*, tab. 567. fig. 17. *Adanson*, pl. 13. fig. 4. *Gualt.* tab. 67. fig. M. *Chemn. Conch.* 5. tab. 187. fig. 1881. 1884.

Se trouve sur les côtes d'Afrique.

Natices crotte de mouche, *Natica ster-
cus muscarum*.

Jaune, blanche, maculée et ponctuée très-