

Une seule espèce a été trouvée, l'argule fondule *Argulus fundulus* (Kroyer) et sur trois hôtes différents : le pseudopleuronecte d'Amérique (mummichog) *Pseudopleuronectes americanus*, le fondule hétéroclite (mummichog) *Heteroclitus fundulus*, et l'épinoche à neuf épines (nine-spined stickleback) *Pygostictus pongitius*.

Ces parasites ont été trouvés indifféremment sur la surface du corps, sur l'opercule des branchies, ou sur les nageoires. Souvent ils étaient complètement enclavés dans la substance de la nageoire ou du corps, de manière à former un nodule causant une inflammation locale marquée.

Nous avons trouvé de plus les copépodes parasites suivants:—

Lernée branchiale *Lernaea branchialis* sur la morue *Gadus callarias*.

Pandore sinueux *Pandorus sinuarius* sur le carcharias du littoral *Carcharias littoralis*.

Némésis robuste *Nemesis robusta* sur le carcharias du littoral *Carcharias littoralis*.

Chondrocanthe cornu *Chondrocanthus cornutus* sur le pseudopleuronecte d'Amérique *Pseudopleuronectes americanus*.

Chondrocanthe de la merluche *Chondrocanthus merluccii* sur la merluche bilinéaire *Merluccius bilinearis*.

Aussi les formes suivantes non-identifiées:

Chondrocanthe *Chondrocanthus* sur la perche de mer, Lernéopodes *Lerneopodae* sur la raie lisse *Raja laevis*, Anchorelle *Anchorella* sur la morue callarias, *Gadus callarias*, l'églefin *Aeglefinus melanogrammus*, et le merlan *Pollachius virens*.