

5e *Obs.* Léonidas L... 11 mois, orphelin, n'a pas été nourri au sein. Il y a quelques jours il est pris de frissons et de fièvre durant 48 heures; il vomit tout puis sa grand'mère remarque que sa tête incline à gauche, que sa jambe gauche est faible et que les mouvements y sont très limités. Cette paralysie semble s'être faite insidieusement et sans provoquer de douleur. Il n'y a plus de reflexe dans cette jambe ni trouble de sensibilité.

6e *Obs.* Le soir du 13 octobre, Alfred P... âgé de 2 ans est pris de frisson et de fièvre, il pousse des cris lorsqu'il fait des mouvements. Puis deux ou trois jours après on constate que les jambes n'exécutent plus de mouvement. Les souffrances continuent durant une douzaine de jours. Mais au moment de l'examen, la douleur est disparue pour laisser place à une paralysie complète. Il n'y a pas encore trace d'atrophie.

En résumé, nous avons rencontré depuis le 1er septembre six cas de paralysie infantile chez des enfants (1 fille et 5 garçons) âgés de 7 mois à 7ans présentant tous un début brusque rappelant la vulgaire indigestion nocturne et ayant pour résultat une paralysie plus ou moins complète d'un ou plusieurs membres, paralysie habituellement indolore, mais rappelant chez deux des petits malades le rhumatisme articulaire aigu.

Le diagnostic d'une telle affection s'imposerait quand même nous n'aurions pas pour nous guider l'article sensationnel paru dans un de nos quotidiens. Comme nous le verrons plus loin, il est guère possible de confondre ces cas de paralysie spinale infantile avec une autre maladie. D'ailleurs son caractère épidémique confirme le diagnostic.

La première description de cette maladie a été faite par Heine en 1840. L'étude en a été complétée par Cornil, Charcot Roger et Pierre Marie.

On remarque, au début, de la fièvre, des frissons, de la céphalée, souvent de la rachialgie et des phénomènes gastro-intestinaux, vomissements, etc. Quelquefois les symptômes nerveux sont très prononcés; coma, délire ou convulsions. Ces attaques peuvent durer quelques heures et la mort peut survenir rapidement. D'habitude, la maladie est plus insidieuse et la paralysie s'installe sans bruit et devient complète en quelques heures. Sa localisation est extrêmement variable; tantôt c'est une monoplégie du bras