

Ex : Ung. Balici simpl..... oz. i
 Spt. Terébentine..... dr. i

on peut encore se servir du Beaume du Canada.

S'il y a beaucoup d'humidité dans la plaie, le Dr Smith conseille de laver la partie avec de l'huile phéniquée, puis de la saupoudrer avec

Ex : Zinci .Oxid..... } oz. i
 Magnes. Carb..... }
 Poudre amidon..... oz. ij

M

Ceci forme une couche protectrice et la guérison s'opère rapidement.

Le Dr Prinkerd traite de la manière suivante une brûlure dont la suppuration est fétide :

R : Iodoforme..... scr ij à iv
 Cérat simpl..... oz i

ou bien, il se sert encore :

R : Chloral Hyd..... dr. ij
 Glycérine..... oz. i
 Aq. distill..... oz. iiij

Quand il y a des vésicules, Lisfranc enlève l'épiderme soulevé par la sérosité, puis recouvre la partie dénudée avec de la charpie enduite de cérat et imbibé le tout avec de la liqueur au chlorure de chaux.

Le Dr A. E. Mayland pour maintenir une brûlure aseptique et prévenir la putridité lave les brûlures avec une solution chaude de sublimé au 1/200 pour entraîner tous les corps étrangers ou rendre stériles tous ceux qu'on est forcé de laisser. La surface brûlée est alors recouverte d'une gaze protectrice trempée dans la même solution ; par dessus, on applique une couche de gaze horiquée imbibée encore de la même solution au sublimé ; enfin le tout est recouvert d'une feuille de gutta percha et l'on fixe le pansement à l'aide de bandes préparées au sub imé. On change ce pansement tous les 2, 3 ou 4 jours selon l'abondance de la suppuration.

Ce traitement est recommandable sous tous les rapports.

Le professeur Huguenier traite les brûlures simples en les saupoudrant soit de bismuth seul, ou encore d'un mélange d'antipyrine, de bismuth et de salol et les recouvre d'une compresse légère de gaze imbibée