

Donc si la largeur des feuilles du blé a une influence fâcheuse, il est naturel de choisir de préférence dans les nombreuses variétés de blé, celles qui sont pourvues de bulbes étroites et dures et dont les tiges sont garnies de feuilles peu larges. Ces sortes de blé sont le plus souvent préservées de la rouille.

Puisque le blé a d'autant plus de chance de résister à la rouille qu'il présente un tissu plus dur et plus serré, il est donc important de choisir les espèces les plus hâtives et de semer de bonne heure autant que possible. Comme la semence est susceptible de retard, sous notre climat, il faut choisir parmi les blés provenant des pays étrangers les variétés hâtives.

Si le sol est trop engraisé, on conseille de semer plus épais que l'ordinaire; car si la quantité de fumier qui a fourni la nourriture à dix pieds de blé la fournit à vingt, l'excès de nourriture sera, par cela même, évité; le blé n'aura pas autant à souffrir de cet excès d'engrais.

On recommande de semer serré, pour éviter que la rouille ne commence; mais la rouille une fois commencée se propage d'autant plus vite sur tout le grain qu'il a été semé serré.

Choses et autres.

Altérations des foins.—Les altérations les plus communes des foins sont les suivantes: ils sont rouillés, moisissés, délavés ou mélangés avec d'autres de qualité inférieure.

Les foins rouillés doivent être bannis de l'alimentation; ils sont, ainsi que les pailles dans cet état, nuisibles à la santé des animaux. Ceux vassés au moins peuvent être corrigés par le battage et les lavements à l'eau courante; on doit, dans ce cas, les arroser avec de l'eau salée.

Les foins délavés, c'est-à-dire qui ont eu trop de pluie, ont perdu une grande partie de leurs propriétés nourrissantes, ils doivent être mélangés avec d'autres mieux conditionnées. On les reconnaît facilement à l'absence de couleur, d'odeur et de goût.

Le mélange de vieux foins avec des foins de l'année est aisément démasqué en le plongeant dans l'eau; le foin de l'année reprendra presque entièrement sa couleur verte primitive, tandis que le vieux foin ne subira pas dans son aspect de modification appréciable.

Mousse dans les pâturages.—La mousse dans les pâturages peut être détruite par la herse et par l'épandage d'un mélange de chaux et d'un tiers de sel marin.

Amendements bien entendus.—Un journal d'agriculture publié en Angleterre, recommande de faire succéder à l'application de l'engrais dans les terres à blé, quelques récoltes propres à ameublir la terre, tels que les pommes de terre, la betterave, ou toutes autres cultures qui exigent le nettoyage du sol. Dans nombre d'endroits on considère une récolte de pommes de terre comme la meilleure de toutes les préparations pour une récolte de blé.

Lavage et salaison du beurre.—Après le barattage du beurre, il suffit de le laver une seule fois à l'eau froide, puis de le presser fortement avec un instrument en bois dur approprié à cette fin, pour en extraire le petit lait; il faudra en même temps le saler au besoin, soit pour être consommé immédiatement, soit pour en faire le commerce. Dans le premier cas, on peut mettre une once de sel par trois livres de beurre; si le beurre doit être gardé longtemps pour le porter sur le marché, une once de sel suffit par chaque deux livres de beurre. Pourvu que le sel soit bien incorporé au beurre, et que le vaisseau soit bien net, qu'il n'y ait pas à craindre qu'il communique un mauvais goût au beurre, il n'est pas besoin d'y ajouter de la saumure, à part le sel.

Gare aux fruits verts.—Maintenant que l'époque de la chaleur approche, les gens devraient apporter toute l'attention possible à leur diète, évitant par dessus tout, les fruits avec la pelure et les légumes vieillissants qui amènent invariablement les crampes, choléra morbus, ou diarrhée. Les enfants sont particulièrement sujets aux malaises de ce genre, et aucune mère ne peut se sentir rassurée sans avoir sous la main une bouteille de *Pain Killer Perry Davis*. C'est sûr, de cure rapide pour les désordres sus-nommés et aucune pharmacie de famille en est complète sans lui. Demandez la grande bouteille à 25 cts.

RECETTES

Moyen de prévenir la formation de la rouille.

On affirme que le fer, plongé pendant quelques minutes dans une solution de carbonate de potasse ou de carbonate de soude, reste ensuite pendant des années sans se rouiller, bien qu'il soit exposé continuellement à l'action d'une atmosphère humide.

Moyen simple d'empêcher les mouches de salir les cadres des tableaux et dorure de glaces.

Faites infuser dans une pinte d'eau bouillante une botte ordinaire de poireaux, laissez refroidir le liquide et en passez légèrement une couche, les mouches ne s'y posent plus.

Vin de groseilles.

On cueille les groseilles par un temps sec, on les égrippe et on les écrase avec un pilon de bois; on laisse reposer la masse pendant 24 hrs, on la presse; on ajoute 2 lbs de sucre 8 onces d'eau de vie pour 4 pots de liquide, si le mélange n'est pas encore limpide; on laisse reposer dix jours et on met en bouteilles.

NOTIONS D'AGRICULTURE

PAR

J.-E. POUILLIOT

A vendre à ce bureau. — Prix 50 cents en librairie, 60 cents par la malle.

N. B.—On le trouve chez les libraires de Québec.
19 mai, 1892, 1 an.