

HÉMIPTÈRES.

Homœmus æneifrons, *Say*.
 Canthophorus cinctus, *Beauv.* (1)
 Ælia americana, *Dall.* (2)
 Cymus angustatus, *Stål.*
 " tabidus, *Stål.*
 Pamera bilobata, *Say*.
 Collaria Meilleurii, *Prov.*
 Lygus flavonotatus, *Prov.* (3)
 " invitus, *Say.* (2)
 Pamerocorie brunneus, *Prov.*
 Plagiognathus fuscus, *Prov.*
 Idolocoris agilis, *Uhler,* (5)
 Oncotylus punctatus, *Reut.*
 Aradus rectus, *Say*.
 Elater lacustris, *Lec.*

Ancurus politus, *Say*
 Coriscina ferus, *Lin.*

HYMÉNOPTÈRES.

Cladius isomira, *Harris.*
 Formica Pensylvanica, *DeGéer.*
 Solenopsis fugax, *Latr.*
 Crabro rufifemur, *Pack.*
 " denticulatus, *Pack.*
 Thyreopus argus, *Harr.*
 Gorytes atricornis, *Pack.*
 Omalus corruscans, *Nort.*

PUIS :

Cicindela vulgaris, *Say.*
 Amara angustata, *Say.*
 Buprestis fasciata, *Fabr.*

Un *Psocus* voisin du *Salicis*, *Walsh*, peut-être une espèce nouvelle, divers diptères, lépidoptères, etc., etc.

(1) Par centaines sur le *Galeopsis tetrahit*.

(2) Un seul exemplaire.

(3) Très commun comme partout ailleurs.

(4) Trois exemplaires.

(5) Pris 5 exemplaires en fauchant dans les herbes, généralement rare.

ETUDE SUR LES MICROBES

PAR LE DR J. A. CREVIER, MONTREAL

(Continué de la page 7).

INTRODUCTION

MICROBES OU BACTÉRIES

Le mot *Microbe* est d'introduction très récente dans la langue française ; il n'y a guère que huit ans qu'il existe, et c'est ce qui explique pourquoi on le chercherait vainement dans la plupart des dictionnaires. Voici dans quelles circonstances ce