

1. Genre PARULA, Bonaparte.

Bec pointu et conique, à sommet courbé dès la base, à commissure légèrement concave ; soies très courtes ; tarses plus longs que le doigt médian ; queue presque carrée et bien plus courte que les ailes.

La Fauvette d'Amérique. *Parula Americana*, Bonap. *Parus Americanus*, Linn. *Sylvia Americana*, Aud. *Sylvia pusilla*, Wils.—Angl. *The Blue Yellow-backed Warbler*.—Longueur $4\frac{3}{4}$; ailes $2\frac{1}{8}$; queues $1\frac{3}{8}$ pouces. Bleue en dessus avec une tache de vert-jaunâtre sur le milieu du dos ; dessous, jaune antérieurement et blanc en arrière, une teinte brune-rougeâtre à travers la poitrine ; tour des yeux bruns ; une petite tache blanche sur chaque paupière ; deux bandes blanches sur les ailes ; les 2 pennes caudales extérieures avec une tache blanche.

E. et R. Cette Fauvette doit probablement se rencontrer aussi en Canada, puisqu'elle niche dans le Massachusetts et le Vermont. Elle place son nid dans l'enfourchement d'une branche d'arbre à une quinzaine de pieds du sol, et pond 4 œufs d'un blanc de crème avec taches de brun-rougeâtre.

2. Genre GEOTHYLPIS, Cabanis.

Bec déprimé et distinctement échancré à la pointe ; soies très courtes ou nulles ; ailes courtes, arrondies, à peine plus longues que la queue, la première primaire plus courte que la 4e ; queue longue, très arrondie, jambes fortes ; dessus vert-olive ; dessous jaune ; jambes jaunes ; queue sans taches.

1. **La Fauvette Trichas.** *Geothlypis Trichas*, Cabanis, *Turdus Trichas*, Linn. *Sylvia Trichas*, Aud. *Sy'via Marylandica*, Wils. *Trichas proscoe*, Nutt.—Angl. *The Maryland Yellow-throat*. — Occiput teint de brun ; menton, gorge, poitrine et dessous des ailes d'un jaune brillant ; ventre d'un gris sale ; une bande noire au front, passant sur les joues et se prolongeant au-dessus des yeux où elle se borde de gris, de manière à former une ligne distincte. Longueur $5\frac{1}{2}$; ailes $2\frac{1}{2}$; queue $2\frac{1}{8}$ pouces.