

Dans une maison ou une salle de classe, 65° est une bonne température.

Dans une chambre de malade, consultez le médecin.

On foule l'ensilage et on ajoute une nouvelle couche à 130° environ.

Traveller's companion.—(Voir spécifique pour la toux.)

Trocart.—On se sert du trocart comme dernier moyen pour sauver un animal atteint de ballonnement. Si on est obligé d'avoir recours à la ponction, elle doit être opérée au milieu du flanc gauche, à l'endroit appelé le *creux du flanc*. Cette partie est aisée à connaître chez une bête qui a le ventre vide ; mais quand elle est *ballonnée*, c'est l'os de la hanche qui doit servir de guide.

On enfonce le trocart en frappant vivement sur le manche, on retire la lame et on laisse la canule par laquelle le gaz s'échappe. On la maintient au moyen de ficelles attachées autour du corps. Si la canule est obstruée par les aliments entraînés avec le gaz, on la débouche avec une mince baguette.

Après le dégonflement on lave la plaie et on fait quelques points de suture ; on la traite comme une plaie ordinaire. Si la ponction est faite *avec un couteau*, la plaie guérit beaucoup plus difficilement.

Dans toutes les fermes on devrait avoir un trocart.

Vaseline (No 16) Ext.—Les usages de la vaseline sont très nombreux. Elle a remplacé toutes les graisses animales dans la préparation