

surface d'une pièce de cinq francs. Perforez ensuite la phlyctène formée et insinuez-y dix centigrammes de poudre d'opium; recourez d'ouate. Dans les cas sévères, usez de la solution suivante:

Picrotoxine	o gr. 05
Alcool q. s. pour dissoudre.	
Chlorhydrate de morphine	o gr. 05
Sulfate neutre d'atropine	o gr. 01
Ergotine Yvon	1 gr.
Eau distillée de laurier-cerise	12 gr.

Filtrez. Donnez v gouttes de cette solution dans un peu d'eau, cinq minutes avant une prise de lait ou de bouillon, sans dépasser xx ou xxv gouttes dans les 24 heures.

Faites procéder à quelques inhalations d'oxygène.

A la fin de la période d'état, vers le troisième septenaire, les vomissements annoncent le plus souvent une péritonite par perforation. Recommandez aussitôt la diète hydrique, le repos absolu avec application d'une vessie de glace sur l'abdomen; employez la préparation à la picrotoxine et lorsque la complication est reconnue précocement, faites appeler le chirurgien.

Durant la convalescence enfin, les vomissements sont quelquefois provoqués par des excès alimentaires, quelquefois au contraire par le retard apporté à la réalimentation, ou encore par une dilatation aiguë de l'estomac: ce fut précisément le cas d'un de nos typhiques de la salle Louis. Maintenez alors votre malade à demi-assis dans son lit, à l'aide d'oreillers et appliquez à l'épigastre une vessie de glace ou un petit vésicatoire. Concuramment, prescrivez la fève de Calabar à petites doses, soit en pilules d'extrait d'un centigramme le matin et le soir, soit en gouttes de la façon suivante: