

FAUNE.

Le gros gibier est abondant dans la majeure partie de cette zone entre les rivières Yukon et Porcupine. De fait, si certaines localités dans l'intérieur de cette zone étaient quelque peu plus accessibles et un peu mieux connues, il y aurait peu d'endroits sur le continent qui présenteraient plus d'attrait pour le chasseur amateur du sport. On rencontre l'orignal, le caribou et le moullon dans tout le district et en certaines localités ils sont très nombreux. L'orignal est de la variété de l'orignal géant, *Alces gigas*; ces gros animaux sont très nombreux surtout au sud de la rivière Noire, presque chaque jour quelques membres de notre mission voyaient un ou plus de ces animaux, pendant que nous travaillions dans la partie sud du district. Un gros animal mâle que l'auteur tua avec son fusil juste au nord du ruisseau Bern, et qui était loin d'être le plus gros animal du district, mesurait 60 pouces entre les andouillers et son poids fut estimé à 1,500 livres vivant. Il y a deux variétés de caribou, le caribou des Terres stériles (Barren Lands) et le caribou géant ou d'Osborn, *Rangifer osborni*. Nous avons souvent vu le caribou géant un ou deux à la fois ou en petits troupeaux de 20 ou 30 individus. Ils étaient particulièrement nombreux entre le ruisseau Ettrairn et la rivière Tatonduk, c'est-à-dire, au sud de la latitude 65° 25', et quand on les voit il est facile de se les procurer, car ils sont plus curieux que craintifs. Quelquefois ils suivront même ou surveilleront un homme ou un cheval pendant plusieurs heures, s'approchant quelquefois à 50 ou 100 verges, quand finalement le flair les avertit. Entre la rivière Porcupine et l'Océan Arctique il y a aussi de grands troupeaux de caribou des Terres Stériles qui descendent au sud de la Porcupine après la gelée d'automne. Nous avons cru que les moullons étaient tous du type de la Montagne Dall, qui est une variété commune au Yukon et dans l'Alaska, et il n'y a aucun doute que quelques-uns sinon tous appartiennent à cette espèce; cependant nous avons vu de nombreux individus à différents endroits et à des distances de 100 yards ou moins, qui semblaient être plus petits et de couleur plus clair que le moullon de Dall. Le moullon vit en été sur les hautes montagnes calcaires, et nous les avons quelquefois vus en troupeaux de 60 à 70 ou même plus. Les ours noirs, bruns, et gris sont aussi abondants à travers toute la zone, et avec le loup, le carcajou, la marte, le lynx, l'hermine, et le renard constituent les principaux animaux à fourrure du district. Les lièvres en 1911 et 1912 étaient aussi très nombreux.

Les principaux oiseaux de gibier sont—le ptarmigan des rochers, *Lagopus rupestris* (Gmelin); le ptarmigan des saules, *Lagopus lagopus*; la perdrix d'épINETTE d'Alaska, *Canachites Canadensis osgoode* (Bishop); les oies Hutchin, *Branta Canadensis hutchinsi* (Rich), et plusieurs autres variétés de canards. Le ptarmigan est très abondant et on le