

3. **B. rave.** *B. rapa*. Dumont. — MANGEL-WURTZEL. — Ⓞ Racine fusiforme, charnue, succulente, rouge, jaune ou blanche. Fleurs glomérulées par 2-4.

Particulièrement cultivée pour la nourriture du bétail. La Betterave croît à peu près dans tous les terrains, mais elle veut une bonne terre saine, très meuble, bien fumée l'année qui précède l'ensemencement, et aussi profonde que possible. La culture tant pour le sucre que pour la nourriture du bétail compte plus de 50 variétés de Betteraves.

## GEN. II. ANSÉRINE. *Chenopodium*. T.

(De *chén.* oie, *pous*, pied ; allusion aux feuilles des principales Espèces figurant une patte d'oie).

*Fleurs* sans bractées, rarement ♀ par avortement. *Calice* libre, 5-4-3-fide ou 5-4-3-partit, à divisions concaves. *Étamines* 5 ou moins, insérées sur le fond du calice. *Styles* 2-3, subulés, libres ou soudés par le bas. *Utricule* membraneux. *Graines* horizontales, lenticulaires. — *Plantes herbacées ou sous-ligneuses.* *Feuilles* alternes, farineuses ou pubescentes. *Fleurs* en épis paniculés. (Fig. 235, 236 et 237).

1. **A. blanche.** *A. album*. Moq. — *C. Ciospermum*. D. C. — (*Chou gras. Poulette grasse*). — WHITE GOOSE-FOOT. HOGWEED. — Ⓞ Plante dressée, de 2-3 p., peu rameuse, strié, ordinairement farineuse ainsi que la face inférieure des feuilles. Feuilles rhomboïdes-triangulaires ou ovales-oblongues, quelquefois sub-3-lobées, sinuées-dentées dans leur moitié supérieure, à dents grosses, inégales ; feuilles supérieures plus rétrécies et plus allongées, souvent entières, Glomérules très farineux, très rapprochés, en épis un peu interrompus. Calice mûr à segments carénés, connivents, enveloppant le fruit. Fleurs petites, vertes, en grappes rameuses, feuillées. — Canada-Caroline ; cours, champs cultivés, etc. ; très commune. Juillet-Septembre.

2. **A. rouge.** *C. rubrum*. L. — RED GOOSE-FOOT. — Ⓞ Feuilles rhomboïdes-triangulaires, fortement sinuées-dentelées, d'un vert foncé, les supérieures petites et entremêlées avec les fleurs. Epis dressés, feuillés. Fleurs d'un vert rougeâtre. Graines très petites. Tige rougeâtre. — Canada-Saskatchewan ; décombres. Juillet.

3. **A. des villes.** *C. urbicum*. L. — *C. deltoideum*. Lam. — Ⓞ Tige de 1-3 p., d'un vert pâle, à branches dressées. Feuilles triangulaires, aigües, grossièrement dentelées. Epis dressés, réunis en une panicule allongée, étroite. Lobes du calice non carénés. Graines à bords arrondis. — Canada-Pennsylvanie ; cours, décombres. Kingston ! Juillet.

4. **A. maritime.** *C. maritimum*. L. — *Chenopodina*. Moq. — Tige de 1½-2 p., rameuse. Feuilles linéaires-subulées, charnués, semi-cylindriques, aigües. Fleurs vertes, en grappes axillaires, sessiles. Étamines plus courtes que les sépales. Utricule semi-transparent renfermant une