

dilatation de l'estomac et l'intoxication subséquente de ces malades.

On pourra aussi donner des lavements alimentaires composés ainsi: Bouillon 500 grammes, 1 à 2 œufs, deux cuillerées à soupe de poudre de viande, 5 à 10 gouttes de teinture d'opium, pour un lavement; en donner deux par jour. Ce lavement alimentaire devra toujours être précédé d'un lavement évacuant. On pourra aussi donner le nitrate d'argent pour cauteriser les ulcérations, l'opium pour arrêter la diarrhée. Le chlorate de soude a été aussi préconisé, mais les résultats obtenus ont été loin d'être satisfaisants.

TRAITEMENT DE L'ECLAMPSIE

PAR LE PROFESSEUR SAULARD

En moins d'un mois nous venons de recevoir dans le service trois malades atteintes d'éclampsie.

Depuis longtemps l'attention des accoucheurs a été appelée sur ces petites épidémies d'éclampsie.

C'est Smillie qui en a parlé le premier, et, pour en expliquer la genèse, il faisait intervenir des conditions météorologiques sur lesquelles il ne donne du reste que des indications très vagues.

Mme Lachapelle en dit aussi quelques mots: "l'éclampsie n'est pas toujours sporadique; une femme affectée de ce mal nous en annonce une ou plusieurs autres."

Dans ma pratique personnelle j'ai vérifié bien des fois la justesse de ces propositions. Alors que j'exerçais la médecine dans les montagnes des Vosges, je restais parfois des mois et des années sans avoir une seule éclamptique; puis, sans cause apparente, j'étais appelé à en soigner plusieurs en quelques jours et en des endroits très éloignés les uns des autres.

Depuis que je suis à la tête de ce service, j'ai vu plusieurs de ces petites épidémies et en voici une nouvelle qui se déroule sous nos yeux.

A quoi donc les attribuer? Certains auteurs, s'appuyant sur le caractère épidémique de l'éclampsie et sur les élévations de