

l'ouverture du thorax, M. Guibal ayant remarqué que le cœur ne battait plus, avait cru d'abord à l'existence d'une plaie de cet organe, mais une péricardotomie exploratrice lui avait montré aussitôt qu'il n'en était rien et l'arrêt ou plutôt la faiblesse des battements du cœur était due simplement à la perte excessive de sang faite par le blessé.

GROSSE DATANT DE SIX ANS DANS LA CORNE GAUCHE D'UN UTERUS BICORNE

MM. Van Der Linden et Goetghebner (de Gand) communiquent l'observation d'une femme de 39 ans, bien réglée jusque là, qui en 1901 vit ses règles s'arrêter pendant six mois. Ce symptôme coïncidant avec le développement anormal du ventre fut interprété comme un signe non équivoque de grossesse. Au bout de ces 6 mois, la malade présenta brusquement des accidents graves d'anémie aiguë (dyspnée, vertiges, nausées, syncopes, accidents qui se répétèrent par crises au cours des deux mois qui suivirent. Puis les règles reparurent, le ventre restant d'ailleurs gros. La malade se soumit alors à l'examen d'un médecin qui conclut à l'existence d'une tumeur abdominale et à la nécessité d'une intervention chirurgicale. Celle-ci fut différée par la malade jusqu'au 27 avril dernier, c'est-à-dire pendant six ans.

L'opération montra l'existence d'une double tumeur abdominale reliée à l'utérus et d'ailleurs adhérente aux tissus voisins et, en particulier, l'S iliaque : une tumeur postérieure qui