

En 6 paquets. Un paquet toutes les 3 heures le jour 4 heures la nuit, de mêmes avec le jus de citron.

Il n'y a guère qu'une contre-indication aux préparations salicylées, l'existence antérieure d'une affection rénale. L'albuminurie d'un rhumatisme actuel demande moins de circonspection. Du reste l'examen de l'urine rend compte non seulement de la possibilité de l'albuminurie, mais de l'élimination du salicylate, si facile à vérifier à l'aide du perchlorure de fer.

Du reste pour éviter l'irritation du rein, prescrire *tant qu'il y a de la fièvre le régime lacté absolu et le repos absolu au lit tant qu'il a des douleurs*, puis régime lacto-végétarien ensuite, et séjour hors du lit progressif.

Après la fièvre, bains chauds, bains de vapeur. *A la convalescence* : toniques, quinquina et fer.

En cas d'anémie persistante; séjour à la campagne, en climat sec.

Mais, en somme, la partie foncière du traitement, c'est l'administration combinée du jus de citron et du *salicylate* donné *jour et nuit, tôt fort et longtemps*.

Docteur GILLET.

Application de la Stovaine en chirurgie urinaire

Pour éviter l'effet nocif, sur le rein, de l'anesthésie générale, et les vomissements qui ne permettent qu'une reprise plus ou moins tardive de l'alimentation, G. Lasio professeur de chirurgie à l'Université de Milan, eut recours à la rachi-stovainisation (exempte des dits inconvénients) dans quarante-deux opérations sur les organes génito-urinaires, parmi lesquelles figurent nombre de prostatectomies, ainsi que des néphrectomies, des lithotrities et des tailles sus-pubiennes.

Et de fait, les troubles secondaires à la rachistovainisation ne se montrèrent que rarement et ils furent sensiblement moins intenses que ceux qu'on observe, d'habitude, après narcose par le chloroforme ou par l'éther.

Holzbach (clinique du professeur Sellheim à Tubingue) puis Csermak (clinique du professeur Makara à Klausenbourg) purent vérifier récemment l'innocuité de la rachistovainisation pour les reins.