

OREILLONS.—Gonflement du tissu cellulaire qui entoure les glandes voisines de l'oreille; la couleur et la forme en sont très variables; chez certaines races, qu'ils servent à caractériser, ils sont partiellement ou totalement absents.

BOUQUET.—Petite touffe de plumes qui protège et recouvre l'oreille.

NARINES. Plumes à la naissance du bec, elles diffèrent souvent de forme et de dimension.

BEC.—Recouvert d'une enveloppe cornée; est droit ou légèrement crochu et varie de couleur.

PLUMES.—Garnissent les diverses parties du corps et comprennent trois divisions principales: grandes plumes, celles du vol et de la queue; moyennes plumes, celles qui servent de recouvrement aux grandes; petites plumes, celles qui s'étendent sur toutes les parties du corps.

Comment on désigne les plumes

Huppe.—Touffe de plumes de différentes formes et positions selon la race, placée sur le sommet du crâne.

DEMI-HUPPE.—Moitié moins forte que la huppe entière.

EPI.—Petite touffe de plumes courtes occupant la même position que la huppe.

FAVORIS.—Petites plumes partant de chaque côté des joues.

CRAVATES.—Petites plumes prenant naissance sous le menton et retombant en s'élargissant en éventail sur le devant du cou.

PLASTRON.—Plumes recouvrant la poitrine.

CAMAIL.—Plumes longues et fines, recouvrant la partie inférieure du dos et retombant de chaque côté des reins; elles n'existent pas chez la poule.

RECTRICES.—Grandes plumes droites de la queue.

FAUCILLES.—Grandes et petites plumes recourbées de la queue des coqs, couvrant presque les rectrices; elles atteignent des proportions considérables dans les races Yokohama et Phénix.