

XI. — Granules contre la toux nerveuse (4 fr. la boîte)

COMPOSITION	ACTION	APPLICATION	DOSES
Sulfhydral, 1 centi. Sel de Gregory, 1 milli. Camphre mono-bromé, 1 centi.	Calment l'irritation du larynx et de la gorge, apaisent les spasmes et invitent au sommeil.	Dans la coqueluche, la trachéite aiguë, la toux nerveuse des hystériques, etc.	Pour les adultes, un granule toutes les demi-heures, jusqu'à effet. Dans la coqueluche, un granule après chaque quinte.

XII. — Granules digestifs (5 fr. la boîte)

Arséniate de strichnine, 1 milli. Quassine amorphe, 5 milli. Papavine pure, 2 centi.	Excitent l'appétit, facilitent la digestion, régularisent les garderobes.	Dans les digestions difficiles, les pesantes digestions, les fermentations anormales, les gastritis-entérites, dyspepsies, etc., et dans les convalescences.	Un à deux granules avant les principaux repas.
--	---	--	--

XIII. — Granules contre les maladies du cœur (4 fr. la boîte)

Arséniate de strichnine, 1/2 milli. Digitaline, 1 milli. Arsén. de fer, 2/5 milli.	Excitent et régularisent les battements du cœur, augmentent la crise sanguine et tonifient l'organisme.	Dans les endocardites, la myocardite parenchymateuse, l'arythmie, l'astystole, l'allumunurie, l'amasique, etc.	Chez les adultes, un granule toutes les 4 h., ou toutes les 3 h., ou toutes les 2 h., suivant la violence des oppressions, la force des palpitations ou la faiblesse du pouls.
--	---	--	--

XIV. — Granules contre le catarrhe des bronches (4 fr. la boîte)

Iodoformé, 1 milli. Codéfine, 5 milli. Emétine, 2/5 milli.	Amènent un état nauséen qui favorise l'expectoration, en même temps que la toux est calmée et les bronches désinfectées.	Toutes les fois que les bronches enflammées sont obstruées par des crachats ; rhume, pneumonie, plastris pulmonaire, etc.	Deux à trois doses le matin à jeun ; trois à quatre doses dans la soirée. Un granule d'heure en heure.
--	--	---	--

XV. — Granules sudorifiques et résolutifs (5 fr. la boîte)

Emétine, 1/2 milli. Chlorhydrate de pilocarpine, 1 milli. Sel de Gregory, 1 milli.	Calment la douleur des angines, détachent les exsudats, amènent la résolution des engorgements pulmonaires, des épanglements pleurétiques, etc. ; calment la dyspnée.	Comme variante dans les angines blanches, les angines diphthériques dans lesquelles le sulfhydral est dominant. À haute dose comme dominante.	Un granule toutes les 2/5 h. d'abord, jusqu'à diaphorèse et état nauséen, puis, toutes les 2 h. seulement.
--	---	---	--

XVI. — Granules antiasthmatiques (5 fr. la boîte)

Arséniate de strichnine, 1/2 milli. Hyoscamine, 1/2 de milli. Lobeline, 2/5 milli.	Font cesser le spasme respiratoire et calment les accès de suffocation.	Pendant les accès d'oppression, dans l'asthme catarrhal, dans l'asthme cardiaque, dans le catarrhe suffoquant, l'emphysème pulmonaire, etc.	Un granule tous les 1/2 d'heure dans les cas aigus, jusqu'à jugulation de l'accès.
--	---	---	--

XVII. — Granules antiblennorrhagiques (4 fr. la boîte)

Sulfhydral, 1 centi. Camphre mono-bromé, 1 centi. Cubébine, 1 milli. Piperine, 1 milli.	Désinfectent les voies urinaires, détruisent les micro-organismes pathogènes, calment le ténèseme vésical.	Dans l'urétrite simple, la blennorrhagie, la cystite blennorrhagique, etc.	Un granule toutes les heures dans les cas aigus, puis toutes les 2 heures.
--	--	--	--

XVIII. — Granules diurétiques et antispasmodiques (4 fr. la boîte)

Ars. de strichnine, 1/2 milli. Bromhydr. de cléutine, 1/2 milli. Hyoscamine, 1/2 de milli. Digitaline, 2/5 milli.	Calment le ténèseme et les douleurs lancinantes, détruisent le spasme du col de la vessie et excitent la sécrétion urinaire.	Rétention d'urine, dysurie, cystite aiguë, etc.	Un granule toutes les 2/5 heures dans les cas aigus, 3 à 4 par jour dans les affections chroniques des voies urinaires.
--	--	---	---

XIX. — Granules contre le rhumatisme et la goutte (4 fr. la boîte)

Colchicine, 1 milli. Aconitine, 2/5 milli. Digitaline, 2/5 milli. Arséniate de strichnine, 1/2 milli.	Agissent sur l'élément diathésique, calment la douleur, abaissent la température et décongestionnent les organes atteints.	Dominante dans le rhumatisme articulaire aigu, le rhumatisme goutteux, les accès de goutte, les névralgies rhumatismales, etc. Variante : Sedlitz Charles Chanteaud le matin.	Un granule toutes les 2/5 heures dans les cas aigus, jusqu'à état nauséen ou diarrhée, puis seulement un granule toutes les 2 ou 3 ou 4 heures.
--	--	--	---

XX. — Granules antiherpétiques (3 fr. la boîte)

Arsén. de strichnine, 1/2 milli. Vératrine, 2/5 milli. Acide arsénieux, 2/5 milli.	Calment les poussées à la peau, en même temps qu'ils tonifient l'organisme.	Dominante dans l'urticaire, l'eczéma, l'hépatose zoster, la fièvre herpétique, l'angine herpétique, etc.	Un granule toutes les heures dans les cas aigus, toutes les 2 à 3 heures ensuite.
--	---	--	---

XXI. — Granules antidiarrhéiques (4 fr. la boîte)

Cotoïne, 1 milli. Sel de Gregory, 1 milli. Salicylate de bismuth, 1 centi.	Moderent le flux intestinal, calment les douleurs abdominales et désinfectent le canal digestif.	Dominante dans la diarrhée, l'enterite aiguë, la cholérine, la dysenterie, etc.	Un granule 4 à 8 fois par jour.
--	--	---	---------------------------------

XXII. — Granules contre l'anémie et la chlorose (4 fr. la boîte)

Arséniate de fer, 1 milli. Quassine, 2 milli. Bromhydrate de quinine, 1 centi.	Augmentent la crise sanguine, régularisent les garderobes, s'opposent aux poussées fébriles périodiques.	Dominante dans l'anémie, la chlorose, les convalescences, etc.	Quatre à huit granules par jour dans les cas aigus, 2 à 4 ensuite.
--	--	--	--