CONTRE LA TOUX AVEC LARYNGITE

Pour adultes:

Sirop d'erysium	aa 60 grammes.
Sirop de codéine	aa oo grammes.
Teinture d'aconit	XXX gouttes.
Hydroat de tilleul. Q. S. pour	180 grammes.

F. S. A. — Par cuillerées à soupe, 5 à 6 fois par jour.

EN CAS D'EXPECTORATION DIFFICILE POUR FLUIDIFIER LES SECRETIONS.

Pour enfants et adultes:

Benzoate de soude	aa	3 gr.
Sirop de tolu	aa	30 gr.
Eau de menthe		gr.

F. S. A. — *Enfants*: par cuillerées à café avant trois ans à dessert de trois à dix ans.

Adultes: par cuillerées à soupe toutes les deux heures.

CYANURES INTRA-VEINEUX ET REJET D'OXYURES PAR LES SELLES.

Les préparations mercurielles (calomel *intus* associé ou non au bismuth, supppositoires mercuriels à l'onguent hydrargyrique) facilitent l'issue des oxyures et peuvent, à la longue, avoir raison de l'oxyurose, comme nous l'avons maintes fois remarqué.

Nous avons vu aussi, à la suite d'injections veineuses de cyanure, en traitant des syphilitiques, même après les premières injections, une véritable débâcle intestinale d'oxyures chez des sujets qui étaient restés porteurs de ces vers malgré divers modes de traitement et qui depuis lors n'ont plus présenté d'oxyures.

Professeur J. Sabrazès.