健之美

・夏天的寵兒・ 健體護膚沐浴法

何絲琳

早來了的炎熱，使人覺得有點那個，每當有事非得上街不可的話，猛烈的太陽真使人畏懼，長懼驕陽如火，使人汗流浹背，汗液之味，往往不知不覺中令人有失禮儀……，故此夏日就使人與「浴」結下不解之緣了。平時愛清潔，愛水的香港人，此時此刻就更「變本加厲」了，「愛浴」其實也是愛美的香港人必不可少的生活程序之一，因爲懂得「浴」和如何「浴」是可直接影響身體健康及保養皮膚和毛髮的重要問題。以下就談談沐浴如何能健體護膚。

皮膚是參預全身代謝過程的，以維持體內外的生理動態平衡，皮膚是重要的測定機體免疫狀況和接受免疫的組織之一。由於皮膚的特殊部位，很多變態反應的現象，都是從皮膚入手的。

現存最早的經典著作——《周禮・曲禮篇》一書中就有「頭有瘡則沐，身有瘡則浴」的記載。歷代又有浴在四肢謂之「漏濆」，浴在腹背謂之「淋射」，浴在下部謂之「浴濆」的說法。由此可見，在科學不發達的我國古代，人們已知道沐浴不僅能清潔皮膚與毛髮，而且還能保健身體和治療疾病。

究竟沐浴有多少種方式呢？不可的話，猛烈的太陽真使人畏懼，長懼驕陽如火，使人汗流浹背，汗液之味，往往不知不覺中令人有失禮儀……，故此夏日就使人與「浴」結下不解之緣了。平時愛清潔，愛水的香港人，此時此刻就更「變本加厲」了，「愛浴」其實也是愛美的香港人必不可少的生活程序之一，因爲懂得「浴」和如何「浴」是可直接影響身體健康及保養皮膚和毛髮的重要問題。以下就談談沐浴如何能健體護膚。

皮膚是參預全身代謝過程的，以維持體內外的生理動態平衡，皮膚是重要的測定機體免疫狀況和接受免疫的組織之一。由於皮膚的特殊部位，很多變態反應的現象，都是從皮膚入手的。

現存最早的經典著作——《周禮・曲禮篇》一書中就有「頭有瘡則沐，身有瘡則浴」的記載。歷代又有浴在四肢謂之「淋射」，浴在腹背謂之「淋漬」，浴在下部謂之「浴濆」的說法。由此可見，在科學不發達的我國古代，人們已知道沐浴不僅能清潔皮膚與毛髮，而且還能保健身體和治療疾病。

究竟沐浴有多少種方式呢？

一、清潔浴：主要是以洗去污垢，汗臭和乾燥的皮屑爲目的，水溫 35—38°C（90°F）左右爲好，用柔軟刷子順着經絡洗刷，可達到一舉兩得既清潔又可刺激經絡而使皮膚毛細血管擴張，令皮脂分泌舒暢，人體精着冷的刺激，調動體內抗病因素，增强身體抵抗力及促進皮膚的微循環。

二、鎮靜浴：主要以恢復身體各部位疲勞爲目的，也就是說，經過沐浴達到輕鬆、安靜、舒適、休息等效果。水溫在38—40°C（100—105°F）爲宜，可將身體舒緩地躺在大浴缸裏，使全身肌肉鬆弛浴。水中先放進粗食鹽三兩（90G）薄荷葉一兩（30G），浸半小時後人再入浴，一般浸浴十五分鐘後擦乾休息。

四、熱水浴：適用於劇烈運動後肌肉緊張强硬未得鬆弛，水溫以38—39°C爲宜，可將受累肌肉之部位浸泡在熱水中，十分鐘後拭乾，擦椒鹽酒配合適當的按摩，效果更佳。此浴法甚適宜做完健美操或大運動量人士，或可在熱水中加一點活絡油更能舒筋活絡。

五、冷水浴：既是一種物理降温法，又是體育鍛煉法，適用於發熱的病人（身體强健者亦可），既如用冷頭墊敷頭那樣，效果奇佳。

皮膚的營養得到充分的補給，因而皮色潤澤、富於彈性。而經絡刺激更是影響到內臟器官之平衡狀態。

二、興奮浴：主要是鍛煉肌膚，振奮精神，一般在清晨進行，水温在18°C左右，用淋浴或盆浴均可，只要使水淋濕皮膚便可，不要超過三分鐘。洗完後用毛巾乾擦，直至皮膚發紅爲止。乾性皮膚都可擦上浴油。

三、鎮靜浴：主要以恢復身體各部位疲勞爲目的，也就是說，經過沐浴達到輕鬆、安靜、舒適、休息等效果。水温在38—40°C爲宜，可將身體舒緩地躺在大浴缸裏，使全身肌肉鬆弛浴。水中先放進粗食鹽三兩（90G）薄荷葉一兩（30G），浸半小時後人再入浴，一般浸浴十五分鐘後擦乾休息。

四、熱水浴：適用於劇烈運動後肌肉緊張强硬未得鬆弛，水温以38—39°C爲宜，可將受累肌肉之部位浸泡在熱水中，十分鐘後拭乾，擦椒鹽酒配合適當的按摩，效果更佳。此浴法甚適宜做完健美操或大運動量人士，或可在熱水中加一點活絡油更能舒筋活絡。

五、冷水浴：既是一種物理降温法，又是體育鍛煉法，適用於發熱的病人（身體强健者亦可），既如用冷頭墊敷頭那樣，效果奇佳。

A、澱粉浴：用250—500G（半斤至一斤）澱粉（如薯粉、豆粉）或麥皮，加水煮熱，再放入半缸、浴缸中，同時倒入100G（5茶匙）蜜糖，作全身浴，有止癢潤膚作用，無刺激性，適用於急性或亞急性皮膚病，無皮膚病的人作此浴可令皮膚潤澤柔滑，是經濟實惠之「妙浴」。

B、醋酸浴：稀醋酸（藥房有售）100—200CC（毫升）放進半缸浴水中，入浴有止癢作用，適用於老年性皮膚癢症，慢風疹，皮膚過敏者。

C、小蘇打浴：用250—500G（藥房有售）作全身浸浴，如局部用則50—100G便夠，適用於銀屑病（牛皮癬），穿高跟鞋女性足部易起的「繭」，皮膚角質層增厚者，香港腳亦適用。

D、婦女下陰瘙癢最佳藥浴：苦參一兩，蛇床子一兩，防風三兩，黃水小半盆（六碗藥液），待沐浴後以此藥液浸洗下陰效果奇佳。

肝的功能

潤華

每個人都有一個肝臟，到底它的功能有幾多？

1、肝與食物新陳代謝關係：

1、將食物中的不同的果糖、乳糖、甘油及氨基酸變成葡萄糖。將血液中提取葡萄糖貯藏於肝或成「動物澱粉」，當體內血糖低時，變由葡萄糖維持血液之平衡。

2、將脂酸變成不飽和，造成磷脂，使容易氧化身體組織。

3、肝將氨基酸（即蛋白質）貯藏起，並以適應身體細胞之需要去分配供給。

二、肝對其他主要物質的製造與貯藏。

1、製血漿蛋白成抗體及維持血管內平常滲透壓。

2、製血液凝血酶元。

3、貯藏脂溶性維生素A、D、E、K。

4、製肝素（使血不凝結）。

5、製尿素（身體的代謝廢物之一）。

6、貯藏血液重要的vitB12。

三、肝細胞每天產五百CC至一千CC胆汁。

四、排洩功能：

1、排洩無用之廢物於胆液。

2、中和和分解毒素（如麻醉藥、安眠藥等）。

3、將紅血球中死亡的血色素含鐵部份收儲藏，其他成胆色素排洩出胆液。

五、抗病菌之功用。

肝內產生大量網狀內皮組織，產生抗毒素和殺菌素。

越慢。這樣，唾液容易濃縮，某些成分停留在管內，沉積得多了就會形成結石。②頜下腺導管的開口較大，異物容易掉進導管。③頜下腺分泌的唾液內含粘液量較高，故較粘稠，易粘附異物。

涎石形成後，往往造成導管堵塞或狹窄，所以容易發生逆行感染而併發頜下腺炎。一般病程很長，呈慢性病變，因爲涎石摘除涎石或摘除頜下腺。

牙石

牙齒上長的石頭叫牙石。牙石一般長在牙頸部，質地堅硬如石。形成牙石的原因主要是唾液中的磷酸鈣、碳酸鈣與食物的殘渣一起沉積在牙頸部，逐漸硬化成石。牙石對牙齦是不良的刺激，可引起牙齦發炎、出血或糜爛，進一步發展可導致牙周病，故應請牙醫師刮除。

喉石

少數人的喉咽裏也會生結石，這是由於喉咽部慢性炎症，加上呼吸氣體中的灰塵的粘附並滯留在喉咽粘膜上，日久天長，結石便逐漸形成。

巧用食鹽

如果在大便秘結或習慣便秘時，每天早晨喝一杯淡鹽開水，可以幫助大便恢復正常。

腹部受涼疼痛時，把粗鹽炒熱裝入布袋，敷於腹部，可以緩解止痛。

當咽喉腫痛，口腔發炎時，每天用鹽水含漱數次，有消炎殺菌的作用。

五官裏的石頭

童義昌 譯編

在人的五官裏，可以生出石頭來，醫學上稱之爲「結石」。其實，每種結石都是一種疾病的表現。

結膜結石

長在眼瞼結膜裏的石頭，叫結膜結石。翻開眼皮，可以看到臉結膜上有大小不一的黃白色小點，質硬如石，就是結膜結石。這種眼病常見於三十五歲以上中年人，平時眼不紅不腫，但總覺得有東西在摩擦眼睛，經常滴眼藥水却不見效。

結膜結石是由脫落的上皮細胞、變性的白細胞和眼淚中少量鈣鹽堆積而成。通常病人患有慢性結膜炎，或者長期有灰沙入眼，使結膜組織發生纖維變性，也可導致結膜石。有的結石突出，可摩擦眼球表面的球結膜或角膜，產生異物感或痛感，對眼睛也有一定的危害，因此要及時治療。

要請醫生清除結膜石。方法很簡單：用百分之一地卡因眼藥水點眼作表面麻醉，然後用針頭將結石剔出，再塗上消炎眼膏即可。

鼻石

鼻子裏生的石頭叫鼻石，多見於兒童。兒童玩耍時，常把豆類、紙團、布片等異物自行塞入鼻腔。異物在鼻腔內滯留時間長了就會壓迫鼻粘膜，引起炎症、腫脹、潰爛，這時鼻腔分泌物中的磷酸鈣、碳酸鈣逐漸沉澱在異物的周圍，形成了以異物爲核心的堅硬鼻石，常呈黃褐色或綠色。鼻石不僅使鼻腔發炎、鼻塞、流鼻涕或鼻出血，堵塞鼻竇口時還可以引起鼻竇炎，或鼻穿孔等。

因此，遇到孩子常流鼻涕或鼻血，或經常鼻塞時，家長應該帶孩子去醫院，請耳鼻喉科醫生檢查，只要取出異物或鼻石，控制感染，上述不適都會迅速消失。

涎石

涎石是常見口腔病之一。大多數涎石是生在頜下腺導管內，呈長柱狀或橢圓形。頜下腺在口底後方頜下三角內，左右各一，有分泌唾液的功能。正常頜下腺如核桃大，質地柔軟，觸摸不到。頜下腺的導管繞過口底的肌肉，自後下方向前上方行走，開口於口底粘膜的舌下肉阜上（見圖），當舌頭上捲時可以見到。

除了常在頜下腺導管內，發現涎石外，少數涎石可生在頜下腺的腺體內。這裏的涎石常呈圓形或結節狀。還有一些涎石一部分在導管內，另一部分在腺體內，這種涎石常呈圓錐狀，底端在腺體中，尖端在導管中。



1、腮腺導管 2、腮腺 3、舌下腺 4、頜下腺導管 5、頜下腺

不論哪個部位的涎石，一般都是單個，淡黃色或棕色，質地硬或緊軟不等，表面光滑或粗糙，常有凹陷的溝形成，這是由唾液引流沖刷而成的。涎石的大小差異甚大，從小米粒到豌豆不等。有人對涎石的成分作了分析，磷酸鈣約佔百分之七十五，碳酸鈣約佔百分之十～十五，此外還有少量的鉀、鈉、鎂、鐵等鹽類，以及細菌、上皮細胞和粘液等有機物，甚至內含牙刷毛、魚刺、骨刺等帶或穿化學纖維內褲而造成局部潮熱，引起皮炎而產生瘙癢。

蟯虫病引起的外陰、肛門部位瘙癢，其特點爲多發生在晚、夜間，且患多爲幼女。

患全身性疾病，如糖尿病的患者，由於糖尿本身對外陰的精神刺激、過度疲勞或條件反射等引起。

根據不同的原因，臨床上結合必要的化驗，比如，滴虫、霉菌、蟯虫檢查，白帶培養等，即可明確診斷。

外陰瘙癢的治療應以「治本」爲主。即既要消除原因，又要對症處理。

預防方面，個人要養成良好的衛生習慣，保持外陰清潔、乾燥。如果出現外陰瘙癢時，一要少抓，因爲一旦搔抓刺激形成，將會愈抓愈癢，引起惡性循環，繼而破壞組織，引起更大感染乃至引起惡變；二是必須早期診斷，早期徹底地治療；三是情緒要保持安定，不能過於煩躁。

女陰瘙癢症的原因及預防

王淑玉

女陰瘙癢症是婦科極常見的多發病之一。它本身不是疾病，而是某些疾病的症狀。這種症狀對患者來說是很難受而又難言的。發病部位常在陰蒂、陰唇附近、有的在會陰、肛門周圍。常在月經期或夜間，或吃刺激性食物後加重。

引起外陰瘙癢的原因很多。原因不同，治療方法也不一樣。最常見的是陰道炎，其中以滴虫性陰道炎和霉菌性陰道炎多見。

滴虫性陰道炎是由陰道毛滴虫引起。毛滴虫在陰道內繁殖、破壞陰道環境引起炎症。表現爲白帶增多，爲膿性、泡沫樣、有腥臭味。道種陰道分泌物刺激外陰，引起瘙癢。霉菌感染所致。一旦感染後，外陰皮膚常養障礙或外陰本身皮膚病變引起。

不良的衛生習慣，如平時或月經期不注意局部衛生，使經血、白帶、尿液積存在外陰，或者過多地用肥皂、高錳酸鉀洗滌外陰，造成外陰過乾、吃刺激性食物後加重。

滴虫性陰道炎

刺激以及容易合併霉菌性陰道炎，可引致嚴重的外陰瘙癢。此外，有的黃疸、核黃素缺乏、白血病等慢性病患者，疾病本身就產生全身癢的症狀，自然也包括外陰瘙癢。也有一部分患者並無明顯原因，而是由於缺少油脂時，也可以產生瘙癢。

藥物過敏或化學性刺激也可以引起瘙癢。譬如某些患者對冲洗陰道或陰道內藥的藥物，如新結霜減、磺胺等產生過敏反應，有的因應用塑料月經通過性交直接傳播。白色念珠菌可以存在於人的口腔、腸道、陰道粘膜上。這些部位可以互相感染。

外陰白色病變，即外陰皮膚、粘膜變白，加上瘙癢症狀。過去稱爲「外陰白斑」，多見於絕經期的婦女。主要是由於外陰皮膚營養障礙或外陰本身皮膚病變引起。

不良的衛生習慣，如平時或月經期不注意局部衛生，使經血、白帶、尿液積存在外陰，或者過多地用肥皂、高錳酸鉀洗滌外陰，造成外陰過乾、吃刺激性食物後加重。

滴虫性陰道炎

滴虫性陰道炎是由陰道毛滴虫引起。毛滴虫在陰道內繁殖、破壞陰道環境引起炎症。表現爲白帶增多，爲膿性、泡沫樣、有腥臭味。道種陰道分泌物刺激外陰，引起瘙癢。霉菌感染所致。一旦感染後，外陰皮膚常