


Ces précautions prises dès les premiers jours chauds du printemps par les intéressés détruiront des milliards de mouches et, du même coup, nous débarrasseront des légions qui nous assaillent pendant les grandes chaleurs. Pour assurer de bons résultats, il faut poursuivre tout l'été durant les mouches et ravager leurs berceaux. C'est en agissant de la sorte avec ensemble que les maladies contagieuses dont les mouches transportent les microbes disparaîtront : diarrhée et paralysie infantile, typhoïde (transmise par le lait dans lequel les mouches se baignent à plaisir), et autres maladies graves.

Brûlez tous les déchets qui pourrissent autour des maisons, des étables et qui, en outre de leur malpropreté dégoûtante, sont une menace pour la salubrité publique; nettoyez souvent ces "privés" ouverts et traitez-les au borax, à la chaux, etc.

3.—L'Oestrie du cheval (*Gastrophilus intestinalis*, *G. hemorrhoidalis*, *G. nasalis*).

Mouche de taille moyenne ou grosse, poilue, aux ailes traversées de bandes sombres. On la voit dans les pâturages pendant juillet et août. La femelle porte au bout de l'abdomen une sorte de dard qui lui sert à déposer ses œufs et non pas à piquer. Seule la larve ou ver est nuisible au cheval. Les œufs sont attachés aux poils des pattes d'avant, des épaules, du gosier, et un peu partout sur le corps. Le petit ver qui sort de l'œuf a le corps garni de petites soies rudes



Filet protecteur fixé à la bride d'un cheval. (D'après Doye).