

effet de modifier assez puissamment le milieu sur lequel vivent les microbes pour diminuer leur pullulation. Peut-être même serait-il plus exact de dire que les antiseptiques, dits pulmonaires, agissent surtout en tarissant la suppuration autour des foyers tuberculeux et en empêchant les infections secondaires de se surajouter à la tuberculose.

Créosote.—“ Parmi tous les remèdes prescrits contre la phthisie pulmonaire, ce que nous avons de moins mauvais, c'est la créosote”, a dit justement Bouchard, à qui l'on doit du reste l'introduction de ce médicament dans la thérapeutique. De fait, bien maniée, la créosote provoque souvent de l'amélioration, à la condition que son action soit aidée par une hygiène parfaite.

Quand faut-il prescrire la créosote ? De préférence en dehors des poussées fébriles, après que l'on est parvenu à diminuer l'étendue des congestions péricuberculeuses. En la donnant pendant une poussée aigue, on s'expose à voir paraître, sous son influence, une augmentation des phénomènes congestifs ; cette crainte a évidemment été exagérée ; mais il y a aussi ce fait, pour contre-indiquer son emploi à ce moment, c'est qu'elle est beaucoup moins efficace.

Par conséquent, on pourra donner la créosote aux malades soit à la première et à la seconde période de la phthisie, en dehors des périodes congestives, soit dans la troisième période, alors même qu'il y a de la fièvre, quand celle-ci est due à la suppuration.

Il n'est pas nécessaire de la donner à des doses très élevées, mais il faut en continuer l'emploi pendant longtemps. Les fortes doses peuvent provoquer de la congestion et des désordres de l'estomac et de l'intestin, et il est douteux qu'elles produisent une guérison plus rapide. Je me contente, en général, d'une dose journalière de 0,40 à 0,60, par la voie buccale ; rarement j'atteins un gramme.

La créosote agit probablement en parcourant, dans le sang, tout le réseau vasculaire du poumon et en s'éliminant par les bronches ; elle se trouve ainsi en contact avec les agents infectieux. Au bout de quelques jours, elle fait cesser la toux et l'expectoration dans des proportions notables, elle stimule aussi les fonctions de l'estomac et, sous cette double action, l'état général se relève.

Il faut avoir soin de donner la créosote pendant ou après le repas, de façon à ce qu'elle ne puisse pas irriter la muqueuse de l'estomac, et de fractionner les doses en les divisant par exemple en trois pour les faire prendre à chacun des repas. Donnée ainsi, elle est facilement supportée et peut être prise sans dégoût et sans accident pendant fort longtemps.

Pilules :

Créosote de hêtre.....	2½ dragmes
Savon amygdalin desséché et pulvérisé	1 once
Pour 10 pilules.—6 par jour. (Bouchard).	

Créosote de hêtre.....	1 dragme
Extrait de gentiane.....	Q. S.
Pour 50 pilules.—6 par jour.	