

constater que la langue avait repris, pour ainsi dire, son aspect normal et que la santé générale était excellente.

* * *

2° CANCER DU LARYNX.—Il s'agit d'un cas traité d'après les indications du professeur Adamkiewicz. La gravité du mal avait nécessité la trachéotomie et l'on voyait de grosses tumeurs épithéliomateuses faire saillie au niveau du cou.

Le relation de ce cas est contenue dans deux lettres adressées à Adamkiewicz par le médecin traitant.

Schopfheim (Grand-duché de Bade),
13 Mars 1902.

"Les injections ont été pratiquées d'après vos indications. Je constate que les tumeurs du cou ont notablement diminué. Le patient peut maintenant prendre des aliments, sans qu'une partie d'entre eux passe par la canule trachéale."

14 Avril 1902.

"Voici maintenant un mois que j'emploie la canéroïne. Le résultat est vraiment des plus remarquables.

"Depuis novembre dernier, le malade gardait le lit. En février, l'état était si grave que la survie ne me semblait pas devoir excéder quelques semaines. Aujourd'hui, le patient reste levé toute la journée et peut se promener dans sa chambre. J'attends le premier beau jour pour lui permettre de sortir.

"Depuis longtemps, l'alimentation était presque impraticable. Les liquides, en particulier, ne pouvaient descendre. Ils s'écoulaient par la canule. Aujourd'hui, une tasse de thé est avalée d'un trait et le malade est en état de prendre part aux repas de famille.

"Les tumeurs du cou ont presque disparu. La peau, qui était rouge et tuméfiée au niveau des parties malades, a repris pour ainsi dire son aspect normal.

"DR. TUTTERLIN."

L'amélioration ne s'est malheureusement pas maintenue et le malade a succombé quelques mois plus tard.

* * *

3° CANCER DE L'ESTOMAC.—Une femme de trente-huit ans, habitant la Palestine, souffrait de l'estomac depuis le mois d'août 1901. Successivement, sensation de constriction au creux épigastrique, perte d'appétit, vomissements, d'abord des aliments solides, puis des liquides, amaigrissement, insomnie.