

N.B. - Chaque poudre devrait d'abord être enveloppée dans du papier blanc épais, et dans du tain ensuite, et elles conserveront ainsi leurs propriétés (si on les garde dans un lieu frais et sec) pendant toute période raisonnable. L'on peut donner aux poulets depuis un sixième jusqu' à la poudre entière, selon leur âge et grandeur. La nourriture pendant cette maladie devrait être du riz bouilli en une masse compacte, dans du lait. Sont nécessaires: du pain rassis trempé dans du lait, toujours fraîchement fait, car s'il était quelque peu sur, cela augmenterait la diarrhée, et un peu de grains de froment et d'orge, la chaleur, la tranquillité et de l'eau propre. Ne donnez pas des stimulants tels que du cognac, mais en cas de grande débilité, l'on peut donner de temps en temps une cuillerée à café de vin d'Oporto.

Dyssenterie.

Ceci est une forme aggravée de la diarrhée, en laquelle cette dernière peut dégénérer si on la néglige. La fiente, dans le cas actuel, est plus ou moins teintée de sang. La forme cholérique causée par les bacteria peut être prise par erreur pour la dysenterie.

TRAITEMENT.—Le même que pour la diarrhée grave, et en outre, l'on peut donner avec chaque poudre, quatre ou cinq gouttes de la "Solution d'Opium de Battley."

La propreté dans ces cas est de la plus haute importance et il faudrait faire constamment usage de notre Désinfectant.

Obstruction de l'Oviducte.

On dit les poules obstruées de l'oviducte lorsqu' elles ne peuvent pas pondre, et cette difficulté provient parfois de la grandeur anormale de l'œuf et est généralement accompagnée d'un état inflammatoire de l'oviducte.

TRAITEMENT.—Une plume imbibée d'huile de ricin devrait être introduite dans l'oviducte, en ayant soin de ne pas briser l'œuf dans le passage, sinon il s'ensuivra probablement une conséquence fatale. Dans des cas fort rebelles, on pourrait