

# SPÉCIALITÉS A. BAILLY

15 . 17 Rue de Rome PARIS (8<sup>e</sup>)  
2-4-6 Rue du Rocher

DÉNOMINATION	COMPOSITION	INDICATIONS	MODE D'EMPLOI
<b>FORXOL</b> (Solution)	Acide glycéro-phosphorique. Nucréinates de Manganèse et de Fer. Méthylarsinates de soude et potasse.	États de dépression. Faiblesse générale. Troubles de croissance et de formation. Neurasthénie. Anémie. Débilité sénile. Convalescences.	Une à deux cuillerées à café, suivant l'âge, au milieu des deux principaux repas, dans un peu d'eau, de vin ou un liquide quelconque.
<b>MÉNATOL</b> (Dragées)	Ovarine. Hydrastis. Hamamélis. Capsicum. Rhamnus. Viburnum. Genista. Marron d'Inde.	Aménorrhée. Dysménorrhée. Métrites. Salpingites. Ovarites. Troubles de la Ménopause.	Deux à six dragées par jour, au début des repas.
<b>OPOBYL</b> (Dragées)	Extrait hépatique. Sels biliaires. Boldo et Combretum.	Hépatites. Ictères. Cholécystites. Lithiasis biliaire. Entréocolites. Constipation chronique. Dyspepsie gastro-intestinale.	Une à deux dragées après les repas.
<b>PULMOSERUM</b> (Solution)	Phospho-Galacolate de Chaux, de Soude et de Codéine.	Toux catarrhale. Laryngites. Bronchites. Congestions pulmonaires. Sequelles de Coqueluche et Rougeole. Bacillose.	Une cuillerée à café matin et soir au milieu des repas, dans un peu d'eau.
<b>PHAGURYL</b> (Dragées)	Santalol $\beta$ , Cédrol. Térébenthinol. Salicylate de Phényle. Lupuline. Formine.	Blennorragie. Rétrocéssements. Urétrites. Cystites. Prostatites.	Six à douze dragées par 24 heures.
<b>QUERGEMOL</b> (Dragées)	Cérebrine. Splénine. Bromhydrate de Quinine. Méthylarsinate disodique. Nucréinate de Manganèse.	Infection paludéenne. Paludisme chronique. Anémie pelustre.	Adultes: Deux à quatre dragées par jour, au début de chaque repas.
<b>THEINOL</b> (Élixir)	Théine en combinaison salicylique. Salicylate d'Antipyrine.	Migraines. Névralgies. Douleurs rhumatoïdes. Crises gastro-intestinales. Dysménorrhée.	Deux cuillerées à dessert à 1 heure d'intervalle l'une de l'autre.
<b>UROPHILE</b> (Granulé Effervescent)	Hexaméthylène Tétramine. Lithine en combinaison benzoïque. Acide Thyminique.	Diabète arthritique. Goutte aiguë et chronique. Gravelle urique. Lithiasis biliaire. Rhumatismes. Cystites.	Une cuillerée à café dans un peu d'eau, deux fois par jour, entre les repas.

ECHANTILLONS & BROCHURES SUR DEMANDE