teau, dont le tranchant regarde en haut, la sclérotique à un tiers de ligne à peu près de la circonférence cornéenne, et deux tiers de ligne au-dessous de la tangente au sommet de la cornée. La pointe du couteau une fois entrée dans la chambre antérieure est d'abord dirigée vers le centre de la cornée jusqu'à une certaine distance, puis elle est ramenée horizontalement et conduite sous le bord sclérotical pour y faire la contreponction, laquelle doit être symétrique à la ponction. La section est ensuite terminée par en haut, par un mouvement de va-et-vient du couteau dont on a le soin de diriger la pointe un peu en avant, afin que l'incision puisse longer tout le temps le bord cornéen.

Second temps.—On remet la pince à fixation à un aide, et de la main gauche, saisissant avec la pince à iridectomie, l'iris qui fait généralement saillie dans la plaie, on excise au moyen des ciseaux toûte la partie herniée, y compris le bord pupillaire. Cette excision doit être pratiquée avec beaucoup de soin, et autant que possible jusque dans les angles de la plaie, afin d'éviter des enclavements iriens toujours nuisibles au succès de l'opération; en effet lorsqu'il y a enclavement de l'iris, la pupille prend une forme irrégulière et est attirée en haut ce qui est une circonstance très défavorable pour la vision; puis la période de cicatrisation ordinaire ment si prompte après cette opération quand elle est bion faite, se prolonge quelquefois très longtemps et rend l'œil beaucoup plus sensible.

Troisième temps.—On reprend de la main de l'aide la pince à fixation, et l'on introduit entre les lèvres de la plaie le cystitôme en le conduisant à plat le long de la surface interne de la cornée jusqu'au bord inférieur de la pupille; et là, abaissant légèrement la pointe de l'instrument, on incise la capsule jusqu'à l'équateur du cristallin en longeant le bord interne de la pupille; une incision semblable est faite du bord externe en partant du même point, et l'on ramène en haut le lambeau triangulaire de la capsule qui résulte de ces deux incisions.