

33 Fleurs bien irrégulières.	POLYGALACEÆ. (32).		45
Fleurs régulières ou tout au plus légèrement irrégulières.		34	
34 Ovaire ou ovaires supérieurs, non soudés avec le calice.		35	
Ovaire soudé avec le tube du calice		36	46
35 Ovaires multiples, distincts, simples. RANUNCULACEÆ. (1).			
Ovaire simple. Feuilles 2 dans le genre <i>Podophyllum</i> .	BERBERIDACEÆ. (4).		47
Ovaire composé.		37	48
36 Involucre à 4 folioles, blanc, inflorescence en cyme.			
.	CORNACEÆ. (44).		
Involucre nul. Feuilles nombreuses et simples.			
.	ONAGRACEÆ. (36).		49
Involucre nul. Feuilles au nombre de 3, composées.			
.	ARALIACEÆ. (43).		
37 Sépales 2, moins nombreux que les pétales.			
.	PORTULACACEÆ. (18).		
Sépales 3-5. Style et stigmate 1.		38	50
Sépales 3-5. Styles et stigmates multiples.		39	
38 Sépales égaux, formant un calice tubuleux.			
.	LYTHRACEÆ. (35).		
Sépales inégaux et presque distincts.	CISTACEÆ. (13).		51
39 Etamines hypogynes, insérées sur le réceptacle.		40	
Etamines périgynes, insérées sur le calice.		41	52
40 Tiges à articulations renflées. Feuilles non ponctuées.			
.	CARYOPHYLLACEÆ. (17).		
Tiges présentant quelquefois des lignes saillantes.			
Feuilles ponctuées.	HYPERICACEÆ. (16).		53
41 Pistils (follicules) distincts, aussi nombreux que les sépales.			
.	CRASSULACEÆ. (39).		54
Pistils 2-5, soudés complètement ou en partie.		42	
42 Styles 2-5. Embryon annulaire ou semi-annulaire.			
.	CARYOPHYLLACEÆ. (17).		55
Styles 2. Embryon droit.	SAXIFRAGACEÆ. (40).		
43 Feuilles opposées.		44	
Feuilles alternes.		51	56
44 Fleurs irrégulières.	SAPINDACEÆ. (31).		
Fleurs régulières.		45	